



Calorimetrische Untersuchungen am hungernden Kaninchen im fieberfreien und fieberhaften Zustande.

Habilitationsschrift

zur

Erlangung der Venia docendi

einer

Hohen medicinischen Facultät zu Marburg

vorgelegt von

Dr. Eberhard Nebelthau,


Assistenzarzt an der medicinischen Klinik.



München.

Druck von R. Oldenbourg.

1894.



Calorimetrische Untersuchungen am hungernden Kaninchen im fieberfreien und fieberhaften Zustande.

Habilitationsschrift

zur

Erlangung der Venia docendi

einer

Hohen medicinischen Facultät zu Marburg

vorgelegt von

Dr. Eberhard Nebelthau,

Assistenzarzt an der medicinischen Klinik.

München.

Druck von R. Oldenbourg.

1894.

Rubner¹⁾ hat den Beweis geliefert, dass das Gesetz von der Erhaltung der Kraft auch am lebenden Thiere Geltung hat. In 45 Versuchen, die je 21 bis 22 Stunden umfassen, zeigte er, dass die direct gemessene Wärmeabgabe genau der aus den Stoffwechselproducten berechneten Wärmemenge entspricht. Die Berechnung der Wärmeabgabe aus den Stoffwechselproducten oder die indirecte Calorimetrie, wie sie auch genannt wird, kann also der directen Calorimetrie als vollkommen gleichwerthig an die Seite gestellt werden, so lange es sich um Tagesversuche handelt.

Die indirecte Calorimetrie lässt uns alsbald im Stich, wenn es sich darum handelt, in kleinen aufeinanderfolgenden Tagesabschnitten die Wärmeabgabe zu bestimmen. Die Schwierigkeiten werden um so grösser, je kleiner man die Zeitabschnitte wählt, so dass es fast unmöglich erscheint, auf diesem Wege den Verlauf der stündlichen Wärmeabgabe genau zu verfolgen.

Durch die Vervollkommnung, welche die directe Calorimetrie durch Rubner²⁾ erfahren hat, sind wir jedoch in den Stand gesetzt worden, die Wärmeabgabe eines Thieres von Stunde zu Stunde, durch Tage und Nächte auf das Genaueste zu verfolgen und zu messen. Wenn auch die Methode solcher ausgedehnten Messungen besonders durch den Mangel graphischer Apparate noch eine sehr

1) Rubner, Die Quelle der thierischen Wärme: a) Berl. klin. Wochenschrift 1891, No. 25 S. 605; b) Zeitschr. f. Biol. Bd. 30 N. F. 12 S. 73.

2) Rubner, Calorimetrische Methodik. Festschr. zu der 50jähr. Doctorjubelfeier des Hrn. Carl Ludwig. Marburg 1890, S. 33.

mühsame ist und sehr umfangreiche Berechnungen erfordert, so schien es mir doch sehr wünschenswerth, Versuche über den Verlauf der stündlichen Wärmeabgabe innerhalb 24 Stunden anzustellen, da solche bisher noch nicht vorliegen.

Es war zu erwarten, dass durch solche Versuche Aufklärung zu erlangen sei, in wie weit wir berechtigt sind, die Wärmeabgabe in den verschiedenen Tagesstunden einander zum Vergleich gegenüber zu stellen und aus Versuchen kürzerer Dauer verallgemeinernde Schlüsse zu ziehen. Auch zur Beleuchtung noch mancher anderer schwebender Fragen können, wie der Verlauf der Versuche zeigte, die Resultate meiner Untersuchungen verwerthet werden. Vor allen Dingen erhoffte ich aber, durch ein genaues Verfolgen der stündlichen Wärmeabgabe während des Fieberanstiegs und der Fieberhöhe unsere Anschauungen über das Wesen des Fiebers zu fördern.

Die experimentellen Untersuchungen am Thiere halte ich in dieser letzten Frage noch so lange für angezeigt, als wir dieselben am Menschen noch nicht mit derselben Vollkommenheit ausführen können und als wir hoffen dürfen, durch unsere Versuche neue Gesichtspunkte für die Beurtheilung der vorliegenden Frage zu erhalten.

Methodik der Versuche.

Die Versuche sind mit dem Calorimeter ausgeführt, wie es im Jahre 1888 in der Zeitschrift für Biologie von Rubner¹⁾ beschrieben worden ist, und zwar wurde die Form gewählt, welche von Rumpel²⁾ zu seinen Versuchen über den Werth der Bekleidung benutzt wurde. Das Princip des Apparats beruht darauf, die Volumenzunahme, welche die in dem Mantelraum des Calorimeters eingeschlossene Luft durch die vom Versuchsthier abgegebene Wärme erfährt, zu messen. Zur Messung dient ein Spirometer, dessen Ausschläge durch Einführung genau bestimmbarer Wärmemengen in das Calorimeter zuvor geaicht sind.

Die mit dem Calorimeter zu messende Wärme entspricht dem grössten Theil der vom Thierkörper durch Leitung und Strahlung

1) Rubner, Ein Calorimeter für physiologische und hygienische Zwecke. Zeitschr. f. Biol. Bd. 25 N. F. 7 S. 400.

2) Rumpel, Ueber den Werth der Bekleidung und ihre Rolle bei der Wärmeregulation. Archiv f. Hygiene Bd. 9 S. 51.

abgegebenen Wärme. Ein kleiner Theil der durch Leitung und Strahlung abgegebenen Wärme erwärmt die zur Ventilation des Calorimeters dienende Luft und wird mit dieser fortgeführt. Derselbe wird berechnet aus der Menge der Ventilationsluft, die durch eine genau arbeitende Gasuhr gemessen wird, und aus der Temperaturerhöhung, welche die Ventilationsluft auf dem Wege durch das Calorimeter infolge der Erwärmung durch den Thierkörper erfährt.

Die Bestimmung des Wasserdampfes darf nach Rubner¹⁾ nicht unterlassen werden, „weil die mit dem Wasserdampf abgegebene Wärme in keinem Verhältniss zur Gesamtwärmeproduction oder zu der an das Calorimeter und die Ventilationsluft abgegebenen Wärme steht“. Durch Bestimmung des Feuchtigkeitsgrades der in das Calorimeter einströmenden und ausströmenden Luft mittelst feiner Haarhygrometer konnte nach dem Vorgange von Rubner²⁾ die stündliche Wasser-Abgabe berechnet und so die durch Wasserverdunstung gebundene Wärme³⁾ auf das Genaueste in Betracht gezogen werden.

Um den Einfluss der Schwankungen des Luftdrucks und der Temperatur der umgebenden Luft auszuschalten, wurde neben dem zur Aufnahme des Thieres bestimmten Calorimeter, durch einen grossen Pappdeckel von ihm getrennt, ein sogenanntes Corrections-Calorimeter aufgestellt. Das mit dem Corrections-Calorimeter in Verbindung stehende Spirometer zeigt also an

- I. den Einfluss des Temperaturwechsels der umgebenden Luft,
- II. die Luftdruckschwankungen.

Das Spirometer, welches mit dem zur Aufnahme des Thieres bestimmten Calorimeter verbunden ist, wird bewegt

- I. durch den Einfluss des Temperaturwechsels der umgebenden Luft,
- II. durch die Luftdruckschwankungen,
- III. durch die Wärmeabgabe des Thieres.

Durch Berücksichtigung der Ausschläge beider Spirometer erhalten wir genau diejenige Grösse, welche der vom Thiere abgegebenen

1) Rubner, a. a. O. (S. 3, 1b) S. 114.


2) Rubner, a. a. O. (S. 3, 2) S. 59.

3) 1 g Wasser wurde mit rund 0,6 Calorien in Anrechnung gebracht; vgl. Rubner, Zeitschr. f. Biol. Bd. 30 N. F. 12 S. 114.

Wärme entspricht. Die Aufstellung der Apparate ist aus beigefügter Skizze leicht zu übersehen.

C₁ entspricht dem Calorimeter, welches das Thier aufzunehmen bestimmt war.

Eine directe Berührung zwischen Thierkörper und Innenwand des Calorimeters wurde durch Einführung eines vorne und hinten verschliessbaren Cylinders aus Drahtgeflecht vermieden, der seinerseits



durch Holzstäbe isolirt wurde. Calorimeter C¹ ist durch eine Glasplatte Gl verschliessbar. Der erforderliche Abschluss zwischen Glas und Metall wurde durch Pech und Gummiringe erzielt. Der Lufteintritt fand bei dem seitlichen Ansatzrohr L statt, und zwar wurde mittelst eines Schlauches die Luft an einer Stelle des Zimmers entnommen, wo die Temperatur genau durch Thermometer 2 T₂ bestimmt wurde. Von derselben Stelle wurde dauernd dem Hygrometer 2 H₂ Luft zugeführt, um fortgesetzt ihren Feuchtigkeitsgehalt beobachten zu können.

Das Corrections-Calorimeter C₂ blieb geöffnet und wurde keiner besonderen Ventilation bedürftig erachtet.

Die gesammte, durch das Calorimeter 1 geführte Ventilationsluft wurde, nachdem ihre Temperatur durch das eingeschaltete Thermometer 1 T₁ bestimmt war, durch das Hygrometer 1 H₁ geleitet

und in der Gasuhr Ga gemessen. Die Ventilation wurde durch eine Münckelsche Wasserstrahlluftpumpe, die bei M angebracht war, besorgt. Das Hygrometer 2 bedurfte nur einer geringen Ventilation; dieselbe wurde durch eine Klemmschraube regulirt, welche an dem von dem Hygrometer abführenden Schlauch angebracht war.

Das Calorimeter 1 und das den Feuchtigkeitsgehalt der ausströmenden Luft bestimmende Hygrometer 1 wurde in den Versuchen I bis IV mit 905—1215 l Luft pro Stunde ventilirt, in den Versuchen V bis VII mit 490—620 l. Eine Condensation von Wasserdampf oder auch nur Einstellung des Apparats auf 100% wurde nie beobachtet.

Die den Calorimetern entsprechenden Spirometer sind mit S1 und S2 bezeichnet.

Die zwei erwähnten Thermometer und die den Hygrometern beigelegten Thermometer waren in $\frac{1}{5}$ Grade getheilt und ebenso wie die Hygrometer auf das Genaueste untereinander verglichen und mit den nöthigen Correctionswerthen versehen. Die Aichung der von mir benutzten Calorimeter geschah durch Vergleichung mit den sorgfältig geachteten Apparaten des hygienischen Instituts und zwar durch Vergleichung des Luftinhalts der Mantelräume.

Während die Spirometer, die Hygrometer und sämmtliche vier Thermometer in Pausen von 10 Minuten abgelesen wurden und zwar mit Hülfe einer Lupe, so dass $\frac{1}{10}^0$ genau notirt werden konnte, erfolgte die Ablesung der Gasuhr stündlich.

Der Barometerstand, welcher zur Berechnung der durch die Ventilationsluft fortgeführten Wärme bekannt sein muss, wurde jede 12. Stunde notirt. Diese zahlreichen Ablesungen wurden bei der langen Dauer der Versuche nur dadurch ermöglicht, dass mich cand. med. Wegeli bei meinen Versuchen in aner kennenswerthester Weise unterstützte.

Als Versuchsthier wurde das Kaninchen gewählt, und zwar wurden sämmtliche Versuche während des Hungerns ausgeführt. Einerseits war ich durch die Grösse meiner Apparate auf das Kaninchen verwiesen, anderseits veranlassten mich zu dieser Wahl die ausführlichen Stoffwechselversuche, welche bereits am Kaninchen angestellt wurden und die im Hunger grosse Gleichmässigkeit aufweisen. Neuerdings hat sich die Wahl noch insofern als vortheilhaft

Tabelle Ia. Versuch No. I.

10. VIII. bis 11. VIII.

11. VIII. bis 12. VIII.

Stunde	Gewicht des Kaminchens	Temperatur des Kaminchens	Temperatur des Zimmers	Wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung an die Ventilations-luft	Gesamtwärmeabgabe durch Strahlung und Leitung	Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung	Gesamtwärmeabgabe in Calorien	Bemerkungen	Gewicht des Kaminchens	Temperatur des Kaminchens	Temperatur des Zimmers	Wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung an die Ventilations-luft	Wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung	Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung	Gesamtwärmeabgabe in Calorien	Bemerkungen
5-6	2182	39,0	14,8	1,2115 4,3128	5,5244	2,5023	8,026	Beginn nach 24 stündiger Carenz	2116	39,1	17,7	1,2734	4,5524	0,9654	6,791	
6-7	—	—	15,0	1,3765 4,3277	5,7042	2,0720	7,776		—	—	—	—	—	—	—	
7-8	—	—	15,9	1,2362 4,1944	5,4306	1,8386	6,769		—	—	—	—	—	—	—	
8-9	—	—	16,1	1,3449 4,5072	5,8521	1,1475	7,000		—	—	—	—	—	—	—	
9-10	—	—	16,4	1,2437 4,7496	5,9933	1,6238	7,617		—	—	—	—	—	—	—	
10-11	—	—	16,8	1,4008 4,2683	5,6691	0,9337	6,603		—	—	—	—	—	—	—	
11-12	—	—	17,4	0,9818 4,1062	5,0870	0,7561	5,843		—	—	—	—	—	—	—	
12-1	—	—	17,6	1,2697 3,8878	5,1575	0,6092	6,767		—	—	—	—	—	—	—	
1-2	—	—	17,9	1,2507 4,0331	5,2838	0,9105	6,194		—	—	—	—	—	—	—	
2-3	—	—	18,1	1,2129 3,9748	5,1877	0,9563	6,144		—	—	—	—	—	—	—	
3-4	—	—	18,5	1,2551 4,0331	5,2882	0,9251	6,213		—	—	—	—	—	—	—	
4-5	—	—	18,8	1,3088 4,1797	5,4885	0,9567	6,445		—	—	—	—	—	—	—	
5-6	—	—	18,6	1,2986 4,5373	5,8359	0,8234	6,659		—	—	—	—	—	—	—	
6-7	—	—	18,3	1,2153 4,0331	5,2484	1,0239	6,273		—	—	—	—	—	—	—	
7-8	—	—	18,4	1,2486 4,3129	5,5615	1,0884	6,650		—	—	—	—	—	—	—	
8-9	—	—	18,7	1,1651 4,2980	5,4031	0,7165	6,120		—	—	—	—	—	—	—	
9-10	—	—	18,7	1,2187 4,3873	5,6050	0,5306	6,137		—	—	—	—	—	—	—	
10-11	—	—	18,3	1,1787 4,3277	5,5064	0,6229	6,129		—	—	—	—	—	—	—	
11-12	—	—	18,1	1,2169 4,4023	5,6192	0,5181	6,137		—	—	—	—	—	—	—	
12-1	—	—	18,2	1,1818 4,4322	5,6140	0,6236	6,238		—	—	—	—	—	—	—	
1-2	—	—	18,2	1,1814 4,5222	5,7036	0,6236	6,327		—	—	—	—	—	—	—	
2-3	—	—	18,2	1,0863 4,3426	5,4289	0,4583	5,887		—	—	—	—	—	—	—	
3-4	—	—	18,3	1,0728 4,3575	5,4308	0,6210	6,051		—	—	—	—	—	—	—	
4-5	—	—	18,3	1,1862 4,4023	5,2885	0,7551	6,044		—	—	—	—	—	—	—	
Summa	—	—	—	—	182,9118	23,1372	156,049		—	—	—	—	—	—	—	
Mittel pro Std.	2151	—	17,65	—	5,5380	0,9640	6,5020		—	—	—	—	—	—	—	
Mittel pro Kilo pro																

Tabelle Ib. Versuch No. I.

10. VIII. bis 11. VIII.

11. VIII. bis 12. VIII.

Stunde	Wärmeabgabe pro Kilo Körpergewicht				Wärmeabgabe pro Kilo Körpergewicht				pro Kilo Körpergewicht		in Summa
	Mittleres Gewicht des Kaminchens	Temperatur des Kaminchens	Temperatur des Zimmers	Feuchtigkeits- gehalt der Luft in %	durch Strahlung und Leitung	Wasser- ver- dunstung	in Summa	Temperatur des Zimmers	Feuchtigkeits- gehalt der Luft in %	durch Strahlung und Leitung	
5-6	—	39,0	14,8	73	2,5317	1,1473	3,679	18,1	67	2,7082	2,966
6-7			15,0	75	2,6189	0,9513	3,570	17,7	67	2,7502	3,206
7-8			15,9	76	2,4958	0,6152	3,111	39,1			
8-9			16,1	76	2,6929	0,5281	3,221				
9-10			16,4	77	2,7701	0,7479	3,508				
10-11			16,8	76	2,6153	0,4307	3,046				
11-12			17,4	76	2,3479	0,3491	2,697				
12-1			17,6	75	2,8464	0,2816	3,128				
1-2			17,9	73	2,4447	0,4213	2,866				
2-3			18,1	72	2,4039	0,4431	2,847				
3-4			18,5	71	2,4529	0,4291	2,882				
4-5			18,8	70	2,5485	0,4444	2,993				
Mittelzahlen	2167	—	16,9	74	2,5572	0,5658	3,123	2117	17,9	2,7292	3,086
5-6			18,6	69	2,7132	0,3828	3,096				
6-7			18,3	70	2,4433	0,4767	2,920				
7-8			18,4	72	2,5918	0,5072	3,099				
8-9			18,7	71	2,5217	0,3343	2,856				
9-10			18,7	69	2,6182	0,2478	2,866				
10-11			18,3	65	2,5747	0,2913	2,866				
11-12			18,1	65	2,6304	0,2426	2,873				
12-1			18,2	67	2,6316	0,2924	2,924				
1-2			18,2	67	2,6764	0,2926	2,969				
2-3			18,2	67	2,5506	0,2154	2,766				
3-4			18,3	67	2,5639	0,2921	2,846				
4-5			18,3	67	2,4913	0,3557	2,847				
Mittelzahlen	2137	—	18,6	68	2,5834	0,3276	2,911				

Tabelle IIa.

Versuch No. II.

21. VIII. bis 22. VIII.

22. VIII. bis 23. VIII.

23. VIII. bis 24. VIII.

24. VIII. bis 25. VIII.

Stunde	Gewicht des Kaninchens	Temperatur des Kaninchens	Temperatur des Zimmers	Wärmeabgabe durch Strahlung u. Leitung an die Ventil.-Luft	Wärmeabgabe durch Strahlung u. Leitung an das Calorimeter	Gesamt-wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung	Wärmeabgabe durch Wasser-Verdunstung	Gesamt-wärmeabgabe in Calorien	Bemerkungen	Gewicht des Kaninchens	Temperatur des Kaninchens	Temperatur des Zimmers	Wärmeabgabe durch Strahlung u. Leitung an die Ventil.-Luft	Wärmeabgabe durch Strahlung u. Leitung an das Calorimeter	Gesamt-wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung	Wärmeabgabe durch Wasser-Verdunstung	Gesamt-wärmeabgabe in Calorien	Bemerkungen	Gewicht des Kaninchens	Temperatur des Kaninchens	Temperatur des Zimmers	Wärmeabgabe durch Strahlung u. Leitung an die Ventil.-Luft	Wärmeabgabe durch Strahlung u. Leitung an das Calorimeter	Gesamt-wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung	Wärmeabgabe durch Wasser-Verdunstung	Gesamt-wärmeabgabe in Calorien	Bemerkungen	
587-637	1832	39,0	15,2	1,0943	3,2656	4,3601	1,5237	5,8838	Be-	1736	39,0	17,8	0,9813	4,9338	5,9181	0,9079	6,8260	7 h In-	648	39,5	14,5	0,7091	2,6246	3,3337	1,0843	4,4180	5,4020	6 h
637-737			15,4	0,8312	4,0039	4,8351	1,0430	5,8781	ginn			17,8	1,0123	4,9181	5,9307	0,7859	6,7166	jection			14,5	0,7091	2,6246	3,3337	1,0306	4,8978	5,9283	von
737-837			15,6	0,9242	4,1944	5,1186	1,3024	6,4210	nach			17,2	0,7774	3,1534	3,9254	1,4452	5,3706	von			14,7	0,7725	3,0947	3,8672	1,0306	4,8978	5,9283	2 cm
837-937			15,7	1,0823	4,6280	5,7103	1,5929	7,3032	34 st.			17,3	0,8880	3,5562	4,4366	1,3904	5,8270	von			15,4	0,9824	4,1062	5,0886	1,1807	6,2693	7,4500	Rothlauf
937-1037			16,0	1,0869	4,5826	5,6695	1,4196	7,0891	Ca-			17,4	0,992	4,3426	5,3346	1,1288	6,4631	von			15,8	1,0558	4,0477	5,1033	1,0918	6,1953	7,2871	Roth-
1037-1137			16,3	1,0424	4,7191	5,7615	1,2415	7,0030	renz			17,5	1,0183	4,9184	5,9364	1,1356	7,0720	Roth-			16,4	0,9294	3,8878	4,8172	1,1147	5,9319	7,0521	lauf-
1137-1237			16,8	1,0493	4,8261	5,8760	1,1938	7,0698				17,7	1,0434	4,9492	5,9925	1,0596	7,0521	Bouill			17,3	1,0353	4,4322	5,4675	1,2176	6,6751	7,8926	Cultur
1237-137			17,1	1,0540	4,7955	5,8195	1,2161	7,0656				17,9	1,0273	4,9338	5,9612	0,8071	6,7683	in die			17,9	1,0532	4,5826	5,6378	1,0608	6,6986	7,4478	vena
137-237			17,4	1,0272	4,7649	5,7921	1,2442	7,0363				18,1	0,9843	4,8108	5,7952	0,8018	6,5970	in die			17,6	1,0352	4,5826	5,6378	1,0608	6,6986	7,4478	jugu-
237-337			17,7	0,9695	4,7802	5,7497	0,9631	6,7128				18,2	1,0267	4,2861	5,3124	1,0074	6,3198	laris			17,9	0,9706	4,1062	5,0908	1,0510	6,1478	7,2471	
337-437			17,9	0,9179	4,6128	5,5307	1,0084	6,5391				18,5	0,9727	4,3222	5,2949	0,8350	6,1299			18,1	1,0701	4,6583	5,7284	1,0984	6,8268	7,9241		
437-537	1784	38,9	18,0	0,9130	4,6431	5,5561	0,9592	6,5153				18,5	0,9726	4,3373	5,2949	0,8350	6,1299			18,3	1,0212	4,4471	5,4683	0,8896	6,3579	7,2471		
537-637			17,9	0,9480	4,4471	5,3956	1,2259	6,6215				18,1	1,0662	3,8575	4,9641	0,8738	5,8389			18,2	0,9947	4,2980	5,2927	0,8372	6,1299	7,0080	1h 40 Urin	
637-737			17,8	1,0117	4,6431	5,6545	0,9962	6,6510				18,2	0,9227	4,7496	5,6718	0,9459	6,6177			17,9	0,9739	4,4822	5,4061	0,6628	6,0689	7,0080	gelassen	
737-837			17,7	0,9855	4,8261	5,8116	0,9605	6,7721				18,3	0,8894	4,9802	5,8699	0,8237	6,6936			17,7	0,9716	4,3826	5,3572	0,7861	6,1436	7,0080	Collaps.	
837-937			17,9	0,9693	4,9184	5,8877	0,8962	6,7839												17,8	1,0269	4,8568	5,8837	0,8160	6,7297	7,0080	Tod	
937-1037			18,1	0,9791	4,9184	5,8955	0,9224	6,8199												17,6	0,985	4,8261	5,8111	0,8272	6,6383	7,0080		
1037-1137			18,1	0,9473	4,9492	5,8967	0,8195	6,7162												17,8	1,0103	4,6431	5,6534	0,9916	6,6450	7,0080		
1137-1237			18,0	0,9830	4,8108	5,7944	0,8718	6,6662												17,8	1,0269	4,8568	5,8837	0,8160	6,7297	7,0080		
1237-137			17,9	1,0113	4,7955	5,8068	0,8285	6,6353																				
137-237			17,8	0,9944	4,8108	5,8052	0,6888	6,4940																				
237-337			18,2	0,9379	4,6735	5,6114	0,6374	6,2488																				
337-437			18,0	1,0213	4,6583	5,6796	0,7471	6,4267																				
437-537			17,9	0,9389	4,6583	5,5922	0,7396	6,3368																				
Summa Mittel pro Stde. u. Stunde	1787	17,27			134,6777	25,0718	159,7495			1711	17,92				81,5538	14,7919	96,3457			1606	17,05				88,2852	16,8397	105,1249	
					3,6116	1,0446	6,6562								5,4369	0,9861	6,4230								5,1923	0,9905	6,1838	
					3,1402	0,5845	3,7247								3,1776	0,5763	3,7539								3,2336	0,6168	3,8504	

Tabelle IIb.

Versuch No. II.

21. VIII. bis 22. VIII.

22. VIII. bis 23. VIII.

23. VIII. bis 24. VIII.

24. VIII. bis 25. VIII.

Stunde	Mittl. Gewicht d. Kaninchens	Temperatur des Kaninchens	Temperatur des Zimmers	Feuchtigkeits- gehalt der Luft in %	Wärmeabgabe pro Kilo Körpergewicht					Bemerkungen	Mittl. Gewicht d. Kaninchens	Temperatur des Kaninchens	Temperatur des Zimmers	Feuchtigkeits- gehalt der Luft in %	Wärmeabgabe pro Kilo Körpergewicht					Bemerkungen	Mittl. Gewicht d. Kaninchens	Temperatur des Kaninchens	Temperatur des Zimmers	Feuchtigkeits- gehalt der Luft in %	Wärmeabgabe pro Kilo Körpergewicht					Bemerkungen							
					durch Strahlung und Leitung	durch Wasser- ver- dunstung	in Summa	durch Strahlung und Leitung	durch Wasser- ver- dunstung						in Summa	durch Strahlung und Leitung	durch Wasser- ver- dunstung	in Summa	durch Strahlung und Leitung						durch Wasser- ver- dunstung	in Summa											
587-637	39,0	15,2	73	2,3824	0,8126	3,215							17,8	67	3,4013	0,5217	3,923		Injection		39,5		14,5	70	2,0253	0,6587	2,681		Injection		40,2	17,0	65	3,5810	0,5570	4,148	
637-737		15,4	76	2,6588	0,5302	3,219							17,8	68	3,4163	0,4527	3,869				14,7	70	2,3570	0,6280	2,985			17,1		67	3,5710	0,4920	4,063				
737-837		15,6	76	2,8092	0,7148	3,524							17,2	64	2,2666	0,8344	3,101				15,4	70	3,1103	0,7217	3,832			16,9		65	3,1522	0,9118	4,064				
837-937		15,7	75	3,1408	0,8762	4,017							17,3	65	2,5674	0,8046	3,372				15,8	69	3,1286	0,6694	3,798			16,7		66	3,6627	0,8723	4,535				
937-1037		16,0	76	3,1251	0,7526	3,908							17,4	66	3,0942	0,6548	3,749				16,4	70	2,9626	0,6584	3,648			16,9		66	3,8012	0,8218	4,629				
1037-1137		16,3	77	3,1831	0,6539	3,869							17,5	65	3,1534	0,6606	4,114				16,9	70	2,9626	0,6584	3,648			16,9		66	3,8012	0,8218	4,629				
1137-1237		16,8	79	3,2549	0,6310	3,915							17,7	66	3,4942	0,6178	4,112				16,9	70	2,9626	0,6584	3,648			16,9		66	3,8012	0,8218	4,629				
1237-137		17,1	79	3,2161	0,6749	3,921							17,9	66	3,4843	0,4717	3,956				16,9	70	2,9626	0,6584	3,648			16,9		66	3,8012	0,8218	4,629				
137-237		17,4	78	3,2211	0,6919	3,913							18,1	66	3,3943	0,4697	3,864				16,9	70	2,9626	0,6584	3,648			16,9		66	3,8012	0,8218	4,629				
237-337		17,7	77	3,2042	0,5368	3,741							18,2	66	3,1195	0,5915	3,711				16,9	70	2,9626	0,6584	3,648			16,9		66	3,8012	0,8218	4,629				
337-437	38,9	17,9	73	3,0896	0,5634	3,653						18,5	65	3,2346	0,4914	3,726			16,9	70	2,9626	0,6584	3,648			16,9	66	3,8012	0,8218	4,629							
437-537		18,0	70	3,1280	0,5370	3,665						39,3	65	3,2306	0,4951	3,746			17,3	62	3,3945	1,1385	4,533			17,4	61	3,7717	0,6813	4,459	Urin gelassen						
Mittelzahl.	1808	16,9	76	3,0365	0,6764	3,713					1718	17,82	66	3,1812	0,5888	3,770			1622	16,63	69	3,0683	0,6667	3,735			1191	17,65	64	3,6473	0,8147	4,462					
537-637	39,0	17,9	69	3,0271	0,6879	3,715							18,1	64	2,6418	0,5182	3,160				18,2	65	3,3225	0,5255	3,848			17,7	61	3,8351	0,9499	4,785					
637-737		17,8	68	3,2334	0,5556	3,739							18,2	65	3,3610	0,5610	3,925				17,9	64	3,4017	0,4173	3,822			35,8	17,6	62	3,9573	0,9527	4,910	Collaps			
737-837		17,7	66	3,2678	0,5472	3,815							18,3	66	3,4901	0,4909	3,981				17,7	64	3,5103	0,4967	4,007												
837-937		17,9	67	3,3223	0,5557	3,828															17,6	65	3,6828	0,5212	4,207												
937-1037		18,1	67	3,3553	0,5217	3,857															17,8	64	3,5937	0,6303	4,224												
1037-1137		18,1	67	3,3425	0,5415	3,821															17,8	64	3,5937	0,6303	4,224												
1137-1237		18,0	67	3,2900	0,4540	3,785															17,8	64	3,5937	0,6303	4,224												
1237-137		17,9	67	3,3045	0,4715	3,776															17,8	64	3,5937	0,6303	4,224												
137-237		17,8	67	3,3093	0,5927	3,702																															
237-337		18,2	68	3,2968	0,5512	3,771																															
337-437	18,0	67	3,2501	0,4276	3,678																																
437-537	17,9	67	3,2107	0,4243	3,635																																
Mittelzahl.	1763	17,94	67	3,2586	0,4854	3,744					1681	18,3	65	3,1656	0,5234	3,689			1580	17,83	64	3,5447	0,5223	4,067			1443	17,06	63	3,8967	0,9513	4,848					

Tabelle IVa.

28. VIII. bis 29. VIII.

29. VIII. bis 30. VIII.

Stunde	Gewicht des Kaninchens	Temperatur des Kaninchens	Temperatur des Zimmers	Wärmeabgabe durch Strahlung u. Leitung an die Ventil.-Luft	Wärmeabgabe durch Strahlung u. Leitung an das Calor.-meter	Gesamt-wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung	Wärmeabgabe durch Wasser-Verdunstung	Gesamt-wärmeabgabe in Calorien	Bemerkungen
Abends 7-8	1748	39,0	19,1	0,8736	2,3810	3,2546	1,1717	4,4263	Be- ginn nach 36 Std.
8-9			18,9	0,8582	2,6652	3,5234	0,8969	4,4203	
9-10			18,8	0,8670	2,7881	3,6551	0,8032	4,4583	
10-11			18,9	0,8912	2,9542	3,8454	0,7064	4,5518	
11-12			18,9	0,7945	2,9261	3,7209	0,7770	4,4979	
12-1			18,7	0,8752	3,0624	3,9376	0,8932	4,8308	
1-2									Thier bleibt im Calor.-met.
2-3									
3-4									
4-5			17,9	0,8731	3,2083	4,0814	0,7619	4,8433	
5-6			18,1	0,8723	3,3810	4,2535	0,5554	4,8089	
6-7			18,2	0,8586	3,1391	3,9977	0,7399	4,7376	
7-8	1704	39,0	18,4	0,8177	3,0806	3,8983	0,6313	4,5296	
8-9			18,2	0,9019	2,9264	3,8283	0,6519	4,4802	
9-10			18,1	0,8495	2,9125	3,7620	0,7221	4,4841	
10-11			18,8	0,8701	2,8708	3,7409	0,6393	4,3802	
11-12			19,2	0,8643	3,0324	3,8967	0,6438	4,5405	
12-1			19,5	0,8321	3,0383	3,8704	0,7401	4,6105	
1-2			19,8	0,8625	2,9642	3,8267	0,7592	4,5859	
2-3			20,0	0,8268	2,9125	3,7393	0,5925	4,3318	
3-4			20,2	0,8263	2,8570	3,6833	0,5648	4,2481	
4-5			20,4	0,7657	2,8156	3,5813	0,4771	4,0584	
5-6			20,4	0,7107	2,8432	3,5539	0,4714	4,0253	
6-7	1659	39,0	20,1	0,7526	2,9125	3,6651	0,6900	4,3551	
Summa						79,6211	15,2161	94,8375	
Mittel pro Stde.	1703		19,09			3,7914	0,7246	4,5160	
Mittel pro Kilo u. Stde.						2,2263	0,4254	2,6517	

28. VIII. bis 29. VIII.

29. VIII. bis 30. VIII.

Stunde	Mittl. Gewicht d. Kaninchens	Temperatur des Kaninchens	Temperatur des Zimmers	Feuchtigkeit der Luft in %	Wärmeabgabe pro Kilo Körpergewicht durch Strahlung und Leitung	Wärmeabgabe pro Kilo Körpergewicht durch Wasser-Verdunstung	Wärmeabgabe pro Kilo Körpergewicht in Summa	Bemerkungen
7-8		39,0	19,1	58	1,8649	0,5711	2,5360	
8-9			18,9	58	2,0215	0,5155	2,5369	
9-10			18,8	58	2,1003	0,4627	2,5630	
10-11			18,9	59	2,2151	0,4669	2,6820	
11-12			18,9	60	2,1477	0,4183	2,5660	
12-1			18,7	60	2,2714	0,4166	2,7880	
1-2								
2-3								
3-4								
4-5			17,9	59	2,3783	0,4457	2,8240	
5-6			18,1	60	2,4816	0,3211	2,8027	
6-7			18,2	58	2,5311	0,4256	2,9567	
Mittelzahl.	1728		18,61	59	2,2221	0,4586	2,6807	
7-8		39,0	18,1	59	2,3843	0,3797	2,7640	
8-9			18,2	60	2,2510	0,4180	2,6690	
9-10			18,1	62	2,2918	0,4252	2,7170	
10-11			18,8	62	2,2087	0,3773	2,5860	
11-12			19,2	61	2,3181	0,3829	2,7010	
12-1			19,5	60	2,2949	0,3301	2,6250	
1-2			19,8	59	2,2708	0,4462	2,7170	
2-3			20,0	59	2,2297	0,3533	2,5830	
3-4			20,2	60	2,2043	0,3017	2,5060	
4-5			20,4	59	2,1462	0,2858	2,4320	
5-6			20,4	59	2,1319	0,2831	2,4150	
6-7		39,0	20,1	58	2,2066	0,4154	2,6220	
Mittelzahl.	1684		19,45	60	2,2217	0,3903	2,6120	

Tabelle IVb.

Versuch No. IV.

30. VIII. bis 31. VIII.

Stunde	Gewicht des Kaninchens	Temperatur des Kaninchens	Temperatur des Zimmers	Wärmeabgabe durch Strahlung u. Leitung an die Ventil.-Luft	Wärmeabgabe durch Strahlung u. Leitung an das Calor.-meter	Gesamt-wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung	Wärmeabgabe durch Wasser-Verdunstung	Gesamt-wärmeabgabe in Calorien	Bemerkungen
7-8			19,0	0,9958	3,7870	4,7828	0,8128	5,5956	
8-9			19,3	0,8562	3,8158	4,6720	0,7273	5,3993	
9-10			19,7	0,9194	4,0185	4,9379	0,7482	5,6861	
10-11			20,0	0,8072	3,9313	4,7385	0,5863	5,3248	
11-12			20,1	0,8348	3,9023	4,7371	0,7128	5,4499	
12-1									Thier bleibt im Calor.-meter
1-2									
2-3									
3-4									
4-5			18,6	1,0271	3,8734	4,9005	0,9602	5,8607	
5-6			18,3	1,0129	3,9168	4,9297	0,7100	5,6397	
6-7									Injection von 2 cem Bouillon subcutan
7-8			17,5	0,8968	3,2369	4,1337	0,7207	4,8544	
8-9			17,8	0,9974	3,6152	4,6126	0,7843	5,3969	
9-10			18,4	1,0509	3,8014	4,8523	0,8133	5,6656	
10-11			18,7	1,0014	3,6581	4,6595	0,8180	5,4778	
11-12			19,0	1,0108	3,7584	4,7692	0,8008	5,5700	
12-1			19,1	1,0318	3,7154	4,7472	0,7844	5,5316	
1-2			19,1	0,9922	3,7297	4,7219	0,5916	5,3135	
2-3			19,4	0,9101	3,6004	4,5405	0,7469	5,2874	
3-4			19,4	0,9228	3,6004	4,5232	0,6802	5,2034	
4-5			19,1	0,9096	3,7727	4,6823	0,7283	5,4106	
Summa						79,9407	12,7563	92,6970	
Mittel pro Stde.	1545		18,9			4,7025	0,7503	5,4528	
Mittel pro Kilo u. Stde.						3,0450	0,4843	3,5293	

31. VIII. bis 1. IX.

Versuch No. IV.

30. VIII. bis 31. VIII.

Stunde	Mittl. Gewicht d. Kaninchens	Temperatur des Kaninchens	Temperatur des Zimmers	Feuchtigkeit der Luft in %	Wärmeabgabe pro Kilo Körpergewicht durch Strahlung und Leitung	Wärmeabgabe pro Kilo Körpergewicht durch Wasser-Verdunstung	Wärmeabgabe pro Kilo Körpergewicht in Summa	Bemerkungen
7-8			19,0	61	3,0095	0,5115	3,5210	
8-9			19,3	60	2,9155	0,4585	3,3740	
9-10			19,7	60	3,1207	0,4733	3,5940	
10-11			20,0	59	3,0006	0,3714	3,3720	
11-12			20,1	58	3,0057	0,4713	3,4770	
12-1								
1-2								
2-3								
3-4								
4-5			18,6	60	3,1603	0,6187	3,7790	
5-6			19,45	60	3,0409	0,4841	3,5250	
6-7			18,3	61	3,1827	0,4583	3,6410	Injection
7-8			17,5	60	2,6851	0,4679	3,1530	
8-9			17,8	60	3,0031	0,5109	3,5140	
9-10			18,4	60	3,1715	0,5315	3,7030	
10-11			18,7	61	3,0556	0,5364	3,5920	
11-12			19,0	61	3,1372	0,5268	3,6640	
12-1			19,1	62	3,1316	0,5174	3,6490	
1-2			19,4	64	3,1210	0,3910	3,5120	
2-3			19,4	62	3,0091	0,4949	3,5040	
3-4			19,4	62	3,0051	0,4519	3,4570	
4-5			19,4	62	3,1198	0,4852	3,6050	
Summa	1525		18,76	61	2,9657	0,4883	3,4540	

Tabelle VIIa. Versuch No. VII.

13. IV. bis 14. IV.										14. IV. bis 15. IV.										15. IV. bis 16. IV.										16. IV. bis 17. IV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Stunde	Gewicht des Kälbchens	Temperatur des Kälbchens	Temperatur des Zimmers	Wärmeab- gabe durch Strahlung u. Leitung an die Ventil.- Luft	Wärmeab- gabe durch Strahlung u. Leitung an das Kälb- chen	Gesamt- wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung	Bemerkungen	Gewicht des Kälbchens	Temperatur des Kälbchens	Temperatur des Zimmers	Wärmeab- gabe durch Strahlung u. Leitung an die Ventil.- Luft	Wärmeab- gabe durch Strahlung u. Leitung an das Kälb- chen	Gesamt- wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung	Bemerkungen	Gewicht des Kälbchens	Temperatur des Kälbchens	Temperatur des Zimmers	Wärmeab- gabe durch Strahlung u. Leitung an die Ventil.- Luft	Wärmeab- gabe durch Strahlung u. Leitung an das Kälb- chen	Gesamt- wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung	Bemerkungen	Gewicht des Kälbchens	Temperatur des Kälbchens	Temperatur des Zimmers	Wärmeab- gabe durch Strahlung u. Leitung an die Ventil.- Luft	Wärmeab- gabe durch Strahlung u. Leitung an das Kälb- chen	Gesamt- wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung	Bemerkungen	Gewicht des Kälbchens	Temperatur des Kälbchens	Temperatur des Zimmers	Wärmeab- gabe durch Strahlung u. Leitung an die Ventil.- Luft	Wärmeab- gabe durch Strahlung u. Leitung an das Kälb- chen	Gesamt- wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung	Bemerkungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰	38,6	16,3	16,3	3,6869	4,2237	0,8249		17,5	0,5350	3,1941	3,7291	0,9249	4,6540	10 h 40	18,0	0,6859	1,6887	3,8746	0,9098	6,3441	10 h 40	16,9	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10 ⁰⁰ -11 ⁰⁰		16,5	0,5404	3,7151	4,2618	0,6905	Be-	17,4	0,4863	3,0664	3,5529	0,7621	4,3150	11 h 40	18,7	0,6048	1,5311	3,9562	1,7044	7,6606	Injection	16,8	0,4308	3,7870	1,3268	0,6812	5,0080		16,8	0,4308	3,7870	1,3268	0,6812	5,0080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11 ⁰⁰ -12 ⁰⁰		16,9	0,5403	3,2513	3,7913	0,6006	nach	17,4	0,3027	3,1656	3,4682	0,6016	4,0700	2 ecm	18,7	0,7246	1,4771	3,9517	1,1506	6,3523	von 2 ecm	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
12 ⁰⁰ -1 ⁰⁰		17,9	0,5353	3,1829	4,0181	0,6552	30st.	17,4	0,3027	3,1656	3,4682	0,6016	4,0700	Rothlauf	18,4	0,6723	3,8741	3,9517	0,9499	5,1956	Bouillon	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1 ⁰⁰ -2 ⁰⁰		17,1	0,5088	3,7012	4,2109	0,6896	Ca-	17,6	0,1740	3,1656	3,6396	0,6629	4,3025	3 h 50	18,4	0,6011	3,0891	3,9517	1,1343	5,3391	cultur sub-	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2 ⁰⁰ -3 ⁰⁰		17,2	0,5075	3,6152	4,1828	0,6938	renz	17,3	0,5089	3,2683	4,7772	0,6829	5,4611	entan	18,2	0,6070	3,0891	3,9517	1,1343	5,3391	gelassen	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3 ⁰⁰ -4 ⁰⁰		17,3	0,5072	3,7626	4,2948	0,7888		17,3	0,5714	4,0331	1,6075	1,2404	2,8479	7 h Urin	17,9	0,5356	3,5115	4,0771	0,8566	4,9337	gelassen	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4 ⁰⁰ -5 ⁰⁰		17,3	0,4473	3,9313	4,1792	0,8081		17,3	0,6327	4,3126	4,9733	1,2962	6,2715	9 h 50	17,9	0,6895	4,1508	4,8398	0,8756	5,7151	Urin	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5 ⁰⁰ -6 ⁰⁰		17,3	0,5073	4,0031	4,5086	0,8081		17,3	0,7105	3,9603	1,6708	0,9883	2,6591	gelassen	17,9	0,6971	4,8722	5,5698	0,9259	6,4957	gelassen	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
6 ⁰⁰ -7 ⁰⁰		17,2	0,4389	4,0916	4,5105	0,7055		17,3	0,5086	1,1062	1,6748	0,8573	2,5321	7 h Urin	18,0	0,6502	4,0039	4,6341	0,7054	5,3395	gelassen	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
7 ⁰⁰ -8 ⁰⁰		17,2	0,5827	4,2092	4,7919	0,7606		17,3	0,6218	4,4023	5,0211	0,8317	5,8528	gelassen	18,0	0,6479	4,2387	4,8896	0,5608	5,8771	gelassen	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
8 ⁰⁰ -9 ⁰⁰		17,1	0,5738	4,4222	4,9860	0,7641		17,7	0,4780	3,6726	4,1506	0,6304	4,7810	9 h 50	18,1	0,6397	4,2873	5,0270	0,8500	5,8770	Urin	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰		17,1	0,5738	4,1944	4,7369	0,6263		17,8	0,6658	4,1797	4,8455	0,7802	5,6257	gelassen	18,0	0,6990	3,8878	4,1868	0,9180	5,4348	gelassen	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10 ⁰⁰ -11 ⁰⁰		17,1	0,4382	3,8580	4,3562	0,6263		17,9	0,6063	3,4829	1,0832	0,5586	1,6417	gelassen	18,1	0,6582	4,5072	5,1604	1,0335	6,1939	gelassen	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11 ⁰⁰ -12 ⁰⁰		17,0	0,6113	4,3873	4,9881	0,8388		17,9	0,5650	3,1941	3,7591	0,5593	4,3184	2 h 20	18,0	0,5027	1,5222	5,0249	0,9761	6,0010	Urin	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
12 ⁰⁰ -1 ⁰⁰		17,0	0,5588	3,8580	4,4168	0,5935		18,0	0,5513	3,4829	4,0312	0,5390	4,5702	gelassen	17,9	0,7333	4,2980	5,0313	0,9790	6,0103	gelassen	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1 ⁰⁰ -2 ⁰⁰		17,0	0,5653	3,6584	4,1637	0,6879		18,1	0,3407	2,9403	3,8110	1,0197	4,8307	2 h 20	17,9	0,6591	4,6583	5,3174	0,6870	6,0044	Urin	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2 ⁰⁰ -3 ⁰⁰		17,1	0,4999	3,8878	4,4377	0,8161		18,2	0,3239	2,9251	3,4523	1,2292	4,6815	gelassen	17,9	0,7148	4,3426	5,0574	0,8032	5,8606	gelassen	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3 ⁰⁰ -4 ⁰⁰		17,1	0,5322	3,7870	4,3191	0,6466		18,0	0,6861	4,0039	4,6903	0,8826	5,5729	6 h 10	17,8	0,6670	3,9458	4,6128	0,6908	5,3036	Urin	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4 ⁰⁰ -5 ⁰⁰		17,0	0,5433	3,9603	4,5236	0,6110		18,1	0,5733	3,6142	4,3173	0,8277	5,1452	gelassen	17,8	0,6790	4,2533	4,9323	0,8590	5,7915	gelassen	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5 ⁰⁰ -6 ⁰⁰		17,0	0,6206	3,9603	4,5863	0,8225		17,9	0,7050	3,5734	4,3781	0,8335	5,2119	gelassen	17,7	0,6672	4,2387	4,9039	0,9032	5,8091	gelassen	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
6 ⁰⁰ -7 ⁰⁰		17,1	0,6309	3,9894	4,6263	0,8417		17,9	0,6934	4,1630	4,6600	0,8012	5,4612	gelassen	17,7	0,6630	4,7039	4,3669	0,8726	6,2395	gelassen	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
7 ⁰⁰ -8 ⁰⁰		17,1	0,6202	4,0185	4,6447	0,8320		17,9	0,6782	4,1471	5,1253	1,0644	6,1897	Inject. von	17,2	0,6143	4,4471	5,0931	0,7770	5,8781	1 ecm Roth-	16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810		16,8	0,4307	3,1683	3,8990	0,6820	4,5810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
8 ⁰⁰ -9 ⁰⁰	2271	38,6	17,2	0,5830	4,3888	0,7657		17,8	0,7189	4,5977	5,3160	1,2111	6,5271	lauff. Bouill.	10,7						2072	16,66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

erwiesen, als von May¹⁾ umfangreiche Stoffwechselversuche an normalen und fiebernden Kaninchen veröffentlicht wurden, die geeignet sind, zum Vergleich mit meinen Versuchen herangezogen zu werden. Es kommt hinzu, dass von May und mir als fiebererzeugendes Mittel Rothlaufbouilloncultur gewählt wurde, und dass wir beide im Anschluss an die Mittheilungen von Emmerich und Mastbaum²⁾ sehr befriedigende Resultate nach manchen vergeblichen Versuchen mit anderen Mitteln erzielten. Ich wandte eine abgeschwächte Rothlauf-Bouilloncultur, von der ich in die Ohrvene, in die Vena jugul. oder unter die Haut injicirte. Die Wirkungsweise ist aus den vorstehenden Tabellen II—VII zu ersehen.

Die Temperaturmessungen der Kaninchen wurden mit einem stumpfwinkelig gebogenen Thermometer ausgeführt, und dabei alle Cautelen beobachtet, die in letzter Zeit genügend besprochen worden sind. Das Thermometer wurde stets 7 cm in den After eingeführt. Die Injectionsstelle wurde mit 96 % Alkohol desinficirt, um den Feuchtigkeitsgehalt der Haut nicht durch andere Desinfectionsmittel zu verändern. Die Kaninchen sassen während der vorbereitenden Hungerzeit auf einem Drahtnetz und wurden einem gleichmässigen Luftstrom, wie im Calorimeter ausgesetzt.

Vor jeder Wägung der Kaninchen wurde der Urin abgepresst. Die Wägungen der Thiere und die Messungen ihrer Körpertemperatur wurden möglichst selten vorgenommen, um die Beobachtung möglichst gleichmässig zu gestalten. Spontane Urinentleerungen in das Calorimeter kamen nur während der Fieberzeit vor; dieselben zeigten sich direct durch das Ansteigen des betreffenden Hygrometers an. Mit der sofortigen sorgfältigen Reinigung des Calorimeters wurde alsdann auch meistens eine Temperaturmessung, häufig auch eine Wägung vorgenommen. Es wurden zunächst 7 Kaninchen, die 24 bis 36 Stunden gehungert hatten³⁾,

1) May, Der Stoffwechsel im Fieber. Habilitationsschrift München 1893 und Zeitschr. f. Biol. Bd. 30 S. 1.

2) Emmerich u. Mastbaum, Die Ursache der Immunität, der Heilung von Infectionskrankheiten, speciell des Rothlaufs der Schweine, und ein neues Schutzimpfungsverfahren gegen die Krankheit. Arch. f. Hygiene Bd. 12 S. 572.

3) Nur in Versuch IV blieb das Thier während der Nacht fünf Stunden lang unbeobachtet, ohne jedoch aus dem Calorimeter herausgenommen zu werden.

24 Stunden hindurch im fieberfreien Zustand beobachtet. Nach dieser Beobachtungszeit (Normalversuch) wurde bei 6 von diesen Kaninchen durch Injection von Rothlauf-Bouilloncultur Fieber erzeugt und die Beobachtung möglichst vollständig fortgesetzt. So liegt ein ausführliches Material vor, um einen Vergleich der Wärmeabgabe bei demselben Thiere an den Normaltagen und Fiebertagen anzustellen. Alle Einzelheiten der Versuche sind in den Tabellen Ia bis VIIa eingetragen.

Die Tabellen Ib—VIIb enthalten sämtliche Werthe auf 1 kg Thier berechnet; diese letzteren Tabellen sind natürlich wegen der grossen Gewichtsabnahme, welche die Thiere während der Carenz erleiden, von grösster Bedeutung. Zur Berechnung dieser Werthe wurde das Gewicht herangezogen, wie es durch Interpolation für die Mitte jeder einzelnen Stunde gefunden wurde. Die Versuche I—IV wurden in dem hygienischen Institut, die Versuche V—VII in der medizinischen Klinik ausgeführt, nachdem ich mich durch zahlreiche Vorversuche mit der Methode vertraut gemacht hatte. Schon die Resultate dieser Vorversuche liessen mich ausnahmslos in den ersten Stunden gewisse Eigenthümlichkeiten zwischen der Wärmeabgabe durch Leitung und Strahlung und der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung erkennen, so dass ich von der Zweckmässigkeit der Versuche überzeugt sein konnte.

Die Calorimeter wurden mir von den Herren Directoren der med. Poliklinik, Prof. Rumpf und Prof. Müller, zur Verfügung gestellt. Die Gasuhr und die Hygrometer wurden mir zum Gebrauch in der Klinik von Herrn Professor Fränkel überlassen. Herrn Prof. Rubner bin ich für die freundliche Unterstützung bei meiner Arbeit zum grössten Dank verpflichtet.

I. Beobachtungen am hungernden nicht fiebernden Kaninchen.

1. Die Gesamtwärmeabgabe in 24 Stunden.

a) Einfluss der Luftgeschwindigkeit.

In der Tabelle VIII sind die gesammten Wärmemengen, welche von 7 Kaninchen im Verlauf des zweiten bis dritten Hungertages während 24 Stunden abgegeben wurden, zusammengestellt. Es darf nach den Versuchen von Rubner¹⁾ als feststehend betrachtet werden,

1) Rubner, a. a. O. (S. 3, 1a u. 1b.)

dass innerhalb dieses Zeitraums Wärmeproduction und Wärmeabgabe als gleichwerthig anzusehen sind.

Tabelle VIII.

No. des Versuchs	Datum	Mittl. Gewicht	Wärmeabgabe in Calorien				Mittlere Temperatur des Zimmers	Mittlere Ven- tilation pro Stunde in l
			in Summa	pro Kilo	pro Kilo und Stunde	pro Quadrat- meter Oberfl.		
II	21. VIII.	1787	159,74	89,39	3,7247	842,36	17,27	930
III	25. VIII.	1932	166,13	85,99	3,5809	831,5	17,57	953
I	10. VIII.	2151	156,04	72,54	3,0228	727,04	17,63	1182
IV	28. VIII.	1709	108,79	63,88	2,6517	592,29	19,09	935
VI	9. IV.	1673	104,68	62,57	2,6073	576,7	19,25	537
V	5. IV.	2189	117,39	53,63	2,2203	540,5	20,4	534
VII	13. IV.	2327	124,19	53,37	2,2237	549,09	17,05	595
II			168,92	94,52	3,9388	890,6	berechnet auf 15° Umgebungstemp.	
III			176,92	91,57	3,8136	885,5		
I			166,18	77,25	3,2192	774,28		
IV			119,94	70,42	2,9234	652,98		
VI			115,93	69,29	2,8875	638,66		
V			133,23	60,86	2,520	613,55		
VII			130,70	56,16	2,354	577,87		

Bei Betrachtung der Tabelle fällt es auf, dass in den Versuchen I, II, III die Wärmeabgabe eine beträchtlich grössere ist, als in den Versuchen IV—VII. Eine Erklärung für diese bemerkenswerthen Differenzen lässt sich weder durch das verschiedene Gewicht geben, noch durch die verschiedenen Aussentemperaturen, bei welchen die Versuche angestellt wurden.

Da meine Versuche zu verschiedenen Jahreszeiten angestellt wurden, wäre an eine gewisse Beeinflussung der Wärmeabgabe durch den verschiedenen Grad der Behaarung der Thiere wohl zu denken. Dieselbe scheint aber nach den Angaben Rubner's¹⁾ nicht von so ausschlaggebender Bedeutung zu sein, dass wir sie als ausreichende Erklärung für unsere Versuche heranziehen könnten. Ebenso wenig ist nach dieser Richtung hin die Angabe Finkler's²⁾ verwertbar, welche besagt, dass im Winter der Stoffwechsel eine spezifische

1) Rubner, Beiträge zur Lehre vom Kraftwechsel. Sitzungsber. der k. bayer. Akad. d. Wiss. 1885 H. 4 S. 461.

2) Finkler, Ueber das Fieber. Separatabdruck aus Pflüger's Archiv Bd. 29 S. 198.

Steigerung erfahre und zwar im Verhältniss wie 100 zu 119,9; denn ich fand gerade bei den von mir im Hochsommer angestellten Versuchen die Steigerung der Wärmeabgabe.

Dagegen scheint es mir von grosser Bedeutung zu sein, dass gerade in den Versuchen, bei welchen eine stärkere Ventilation des Versuchsraumes stattfand, auch eine bei weitem grössere Wärmeabgabe nachzuweisen war. Eine Ausnahme machte nur Versuch IV, auf den ich später zurückkomme.

Ueber eine Beeinflussung der Wärmeabgabe resp. Wärme-production durch die Luftgeschwindigkeit konnten nähere Angaben in der Literatur nicht gefunden werden. Es lag nicht in dem Rahmen meiner Arbeit, diese Verhältnisse eingehender zu studiren, jedoch sollen hier die gemachten Beobachtungen kurz angeführt werden. Aus meinen 7 Versuchen habe ich berechnet, wieviel Procent der durch Leitung und Strahlung abgegebenen Wärme mit der Ventilationsluft fortgeführt werden, und die Resultate in Tabelle IX zusammengestellt.

Tabelle IX.

No. des Versuches	Mittleres Gewicht	Mittlere Ventilation pro Stunde in l	24stündige durch Leitung u. Strahlung abgegebene Wärmemenge	An die Ventilationsluft durch Leitung u. Strahlung abgegebene Wärmemenge	
				in Calorien	in %
II	1787	930	131,67	23,750	17,6
III	1932	953	137,19	21,143	16,8
I	2151	1182	132,91	29,343	22,07
IV	1703	935	91,13	17,647	22,1
VI	1673	537	87,113	9,997	11,4
V	2189	534	97,25	9,28	10,3
VII	2327	595	106,58	13,294	12,4

Durch diese Zahlen wird zunächst ein Beleg dafür erbracht, dass um so mehr Wärme mit der Ventilationsluft fortgeführt wird, je stärker das Calorimeter ventilirt wird.

Auffallend gross ist der Procentsatz der an die Ventilationsluft abgegebenen Wärmemenge in Versuch IV. Es dieses Resultat darauf zurückzuführen, dass in Versuch IV die gesammte Wärmeabgabe trotz der stärkeren Ventilation eine im Vergleich mit Versuch I—III verhältnissmässig geringe ist.

Wir dürfen annehmen, dass in diesem Versuche (IV) die Ventilationsgrösse während der ersten 24 Stunden ohne wesentlichen Einfluss auf die Wärmeabgabe gewesen ist, dass sich das Thier also gegen eine Steigerung der Wärmeabgabe wohl noch auf physi-kalischem Wege zu schützen vermochte.

Die Individualität des Thieres spielt hierbei sicher eine grosse Rolle; es sei aber ausserdem noch darauf aufmerksam gemacht, dass Versuch IV bei einer etwa 1,05° wärmeren Temperatur ausgeführt wurde, als Versuch I—III.

Nehmen wir aus den Resultaten der Versuche I—III und V—VII das Mittel, so erhalten wir die folgenden Zahlen:

Tabelle X.

Versuch	Gewicht der Thiere	Temperatur des Zimmers	Grösse der Ventilation in l pro Stunde	Gesamt- Calorien- Abgabe
I—III	1957	17,49	1023	160,62
V—VII	2063	18,9	555	115,42

Wird alsdann der Einfluss, welchen die verschiedene Tempe-ratur auf die Wärmeabgabe ausübt, dadurch ausgeglichen, dass wir nach den Angaben von Rubner für einen Grad Temperaturdifferenz 2,5% der Wärmeabgabe in Rechnung setzen, so verhält sich die Wärmeabgabe bei schwacher und starker Venti-lation wie 100 zu 134,4.

Sollte diese Differenz thatsächlich, worauf meine Versuche hin-weisen, im Wesentlichen durch die grössere Ventilation herbeige-führt sein, so werden wir in der Bewegung der Luft einen Factor zu erblicken haben, der in ungeahnter Grösse den Wärmehaushalt des Thieres beeinflusst; denn die Geschwindigkeit der Luft in einem Cylinder von 63 cm Länge und 24 cm Durchmesser, wie ihn das von mir benutzte Calorimeter darstellt, ist bei einer stündlichen Lüftung von 555—1023 l Luft eine äusserst geringe und für unsere Empfindungsapparate nicht einmal wahrnehmbar. Letzter Umstand verdient besonders hervorgehoben zu werden, um sich eine Vor-stellung von der Schärfe zu machen, mit welcher die der Wärme-regulierung vorstehenden Apparate arbeiten. Man wird sich aber auch zugleich, wenn man diese Reaction auf einen verhältnissmässig

geringen Reiz richtig beurtheilen will, gegenwärtig halten müssen, dass das Kaninchen der umgebenden Luft eine grosse Oberfläche im Vergleich zur Körpermasse darbietet.

Für das Bestehen einer chemischen Wärmeregulation ist durch Colosanti, Finkler, Pflüger, Voit und Rubner der unbedingte Beweis erbracht.

Als Ausdruck der chemischen Wärmeregulation ist eine reflectorische Verminderung resp. Zunahme des Stoffumsatzes anzusehen, welcher auf eine Steigerung oder einen Abfall der umgebenden Lufttemperatur allerdings nur innerhalb gewisser Grenzen erfolgt. Der chemischen Wärmeregulation hat Rubner¹⁾ die physikalische gegenüber gestellt, welche dazu dient, bei sinkender Lufttemperatur den Wärmeabfluss zu hemmen, bei steigender Lufttemperatur der Wärme einen besseren Abfluss zu verschaffen. In gleicher Weise tritt nach der Nahrungsaufnahme und bei Arbeitsleistung die physikalische Regulation in Thätigkeit, um einer Ueberhitzung des Körpers vorzubeugen. Als solche physikalisch regulirenden Mittel sind zu nennen: die Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung (Schweissdrüsen, Athmung), die Veränderlichkeit der Blutfülle in der bedeckenden Haut, die Veränderlichkeit der wärmeabgebenden Oberfläche durch Haltung und Lage.

Die Steigerung der Wärmeabgabe, welche infolge verstärkter Ventilation des Calorimeters eintritt, haben wir als den Ausdruck einer chemischen Regulation aufzufassen. Eine unverhältnissmässige Vermehrung der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung liegt, wie wir weiter unten zeigen werden, nicht vor.

Wenn sich auch nach meinen Versuchen ein durchaus sicheres Urtheil über den Einfluss der Ventilationsgrösse resp. der Luftgeschwindigkeit auf die Wärmeabgabe noch nicht fällen lässt, so weisen dieselben doch darauf hin, dass bei allen vergleichenden Versuchen, mag es sich nun um 24stündliche oder um kurzdauernde Perioden handeln, die Ventilationsgrösse einer genaueren Berücksichtigung bedarf, als ihr bisher zu Theil wurde. Angaben über

1) Rubner, Biolog. Gesetze, Marburg 1887; vergl. ausserdem Rubner: Ueber den Werth und die Beurtheilung einer rationellen Bekleidung. Deutsche Vierteljahrsschrift f. öffentl. Gesundheitspflege Bd. 25 S. 471.

die Menge der ventilirten Luft müssen offenbar genaueren Angaben über die Geschwindigkeit der Ventilationsluft weichen. Es ist selbstverständlich, dass der Einfluss der Luftgeschwindigkeit bei allen Stoffwechselversuchen gleich bedeutungsvoll ist.

b) Einfluss der Körper-Grösse und -Oberfläche auf die Wärmeabgabe.

Bei den folgenden Ueberlegungen, welche sich auf einen Vergleich der bei den verschiedenen Thieren gewonnenen Resultate stützen, werden wir die Versuche I—III und IV—VII infolge des durch die verschieden grosse Ventilation bedingten Unterschiedes in der Versuchsanordnung gesondert betrachten.

Rubner¹⁾ hat durch zahlreiche Versuche, welche er an Hunden von verschiedener Grösse anstellte, den Beweis geliefert, dass mit dem Sinken des Körpergewichts ein allmähliches Ansteigen der Intensität der Verbrennung verbunden ist. Er führte sodann den Nachweis, dass als Ursache für den relativ höheren Gesamtstoffwechsel kleinerer Thiere die relativ grössere Oberfläche derselben anzusehen sei, nachdem bereits früher von Bergmann²⁾ auf dieses Abhängigkeitsverhältniss hingewiesen war.

Rubner stellte eine Formel³⁾ für die Oberflächen-Berechnung aus dem Gewichte des Thieres und einer gewissen Constanten auf, diese Constante wurde durch directe Messung der Oberfläche für eine jede Thierart bestimmt.

Es ergab sich alsdann durch die Vertheilung der abgegebenen Wärmemengen auf die so berechnete Oberfläche, dass von sieben Hunden, deren Gewicht zwischen 3 und 31 kg schwankte, pro Quadratmeter Oberfläche annähernd die gleiche Wärmemenge abgegeben wurde. Für jede Thierart stellte die Wärmeabgabe pro Quadratmeter Oberfläche eine besondere Grösse dar.

Auch aus meinen Versuchen IV—VII (Tab. VIII) ergibt sich, dass im Allgemeinen die Gesamtwärmeabgabe in 24 Stunden mit

1) Rubner, Einfluss der Körpergrösse auf den Stoff- und Kraftwechsel. Zeitschr. f. Biol. Bd. 19 S. 535 N. F. 1.

2) Cit. nach Rubner, a. a. O. (1.)

3) Die Formel lautet $O = K \sqrt[3]{a}$

O = Oberfläche, a = Gewicht, K = Constante, beim Kaninchen Constante 12,88.

zunehmendem Körpergewicht des Thieres steigt, die Wärmeabgabe pro Kilo Thier dagegen abnimmt; diese Thatsache, welche Rubner am Hunde durch indirecte Calorimetrie festgestellt hat, erhält durch meine auf dem Wege der directen Calorimetrie gewonnenen Resultate für das Kaninchen eine Bestätigung. Bei Berechnung der Wärmeabgabe pro Quadratmeter Oberfläche tritt in den Versuchen IV bis VII eine ähnliche, auffallende Gleichmässigkeit hervor, wie sie Rubner für die Wärmeabgabe beim Hunde fand. Eine gewisse Abhängigkeit von der Grösse scheint sich jedoch besonders bei Berücksichtigung der auf 15° reducirten Werthe auch hier geltend zu machen.

Ich sehe mich genöthigt, auf dieses Verhalten an dieser Stelle nochmals einzugehen, da die Abhängigkeit der Wärmeabgabe von der Körpergrösse für die Beurtheilung meiner Versuche von der allergrössten Bedeutung ist. Wie schon oben bemerkt, wurden meine Versuche, die sich zum Theil über zwei bis vier Tage erstreckten, an hungernden Kaninchen angestellt. Wie aus den Tabellen II bis VII zu ersehen ist, nahmen die Kaninchen im Verlaufe von drei Tagen um $\frac{1}{8}$ bis $\frac{1}{6}$ ihres Gewichts ab. Nach dem Gesagten steht zu erwarten, dass diese Gewichtsabnahme von grossem Einfluss auf die Wärmeabgabe sein muss. Man wird daher bei einem Vergleich der Wärmeabgabe an den einzelnen Tagen bestrebt sein müssen, diesen Einfluss in Rechnung zu setzen. Wie es nun feststeht, dass die Gewichtsabnahme bei den einzelnen Individuen während des Hungers keineswegs nach einer einheitlichen Formel verläuft, so werden wir auch nicht erwarten können, eine solche für die Wärmeabgabe aufstellen zu können. Es wäre daher missig gewesen, Versuche nach dieser Richtung hin mit den uns zur Verfügung stehenden Apparaten an den einzelnen Kaninchen anzustellen. Ich habe jedoch aus der Literatur einige Versuche von Rubner¹⁾ und May²⁾ in der Tabelle XI zusammengestellt, wodurch der Verlauf der Wärmeabgabe an mehreren auf einander folgenden Tagen während des Hungers demonstrirt wird.

1) Rubner, a. a. O. (S. 28, 1) S. 540.

2) May, a. a. O. S. 35.

Die Versuche von Rubner wurden am Hunde ausgeführt, die von May am Kaninchen. Nur in Versuch IV wurde von Rubner die directe Calorimetrie angewandt, sonst sind die Resultate durch indirecte Calorimetrie gewonnen.

Tabelle XI.

Autor	No. des Versuches	Carenztag	Gewicht des Thieres	Gesamtwärmeabgabe in Calorien	Wärmeabgabe	
					pro Kilo	pro Quadratmeter Oberfl.
Rubner ¹⁾	I	1	6150	338,80	63,22	1037,9
		2	5980	339,24	56,73	922,68
"	II	1	6660	399,20	59,94	1010,5
		2	6500	362,25	55,73	931,96
"	III	3	6360	345,92	54,39	902,98
		1	11110	704,59	63,42	1268,0
"	IV	2	10870	663,50	61,04	1211,6
		1	4567	274,7	73,98	894,24
"	V	2	4480	260,1	72,577	857,63
		3	4393	236,4	71,166	789,73
May ²⁾	VI	3	3345	210,1	62,8	729,3
		4	3230	202,31	62,6	718,84
"	VII	3	2838	148,85	52,4	576,5
		4	2737	150,5	54,9	597,19

Aus den Resultaten ist zu ersehen, dass im Hunger mit sinkendem Körpergewicht beim Hunde sowohl die Gesamtwärmeabgabe, als auch die Wärmeabgabe pro Kilo Körpergewicht abnimmt.

Ich habe in diesen Versuchen auch die Wärmeabgabe pro Quadratmeter Oberfläche berechnet. Diese Grösse nimmt ebenfalls von Tag zu Tag während des Hungers ab. Es besteht also insofern auch eine gewisse Abhängigkeit der Wärmeabgabe pro Quadratmeter Oberfläche von dem Körpergewichte.

Leider sind die Versuche, welche zum Vergleich über die tägliche Wärmeabgabe der Kaninchen vorliegen, sehr spärliche. Wenn in dem einen nach May citirten Versuch Nr. VI, ebenso wie auch in einigen von Rubner angestellten Versuchen, die hier nicht angeführt wurden, die Wärmeabgabe an einem folgenden Hungertage

1) Die Werthe in Versuch I—III sind auf 15° Umgebungstemperatur umgerechnet. Versuch IV wurde bei 20° 2 angestellt.

2) Vergl. Tab. XVIII II u. G.

grösser ist, als an einem vorhergehenden, so ist dieser Umstand möglicherweise auf unruhiges Verhalten des Thieres zurückzuführen. Wir wären damit auf eine eventuelle und wohl zu berücksichtigende Fehlerquelle, auch für vergleichende Versuche, die an ein und demselben Thiere angestellt werden, aufmerksam gemacht. In dem anderen aus der Arbeit von May mitgetheilten Versuch (Tab. XI Vers. V) ist die Gesamtwärmeabgabe am dritten Hungertage zwar grösser als am vierten, jedoch ist der Unterschied ein geringer. Ob sich das Kaninchen infolge seiner relativ grösseren Oberfläche nach einer längeren Hungerzeit anders verhält, als der Hund, ist auf Grund dieses einen Versuches nicht zu entscheiden.

Bei der Beurtheilung von Versuchen, die sich auf den Vergleich der Wärmeabgabe an mehreren aufeinander folgenden Hungertagen stützen, müssen wir also unter Umständen grosse Vorsicht walten lassen, da sich das Urtheil manchmal nur auf Schätzung stützen kann. Es sei hier gleich bemerkt, dass nur in einem unserer Versuche (VI) bei der Beurtheilung des Resultates Zweifel entstehen können.

c) Wärmeabgabe durch Leitung und Strahlung
im Verhältniss zur Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung.

Rubner¹⁾ hat erst kürzlich sehr umfangreiche Versuche mitgetheilt, in denen er die Wärmeabgabe durch Leitung und Strahlung und durch Wasserverdunstung unter sehr wechselnden Bedingungen studirte. Er zeigte unter anderem, dass ein Abhängigkeitsverhältniss besteht zwischen der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung einerseits und der Feuchtigkeit und Temperatur der umgebenden Luft andererseits, und zwar in dem Sinne, dass die Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung sich bei steigender Feuchtigkeit der umgebenden Luft verringert, bei steigender Temperatur aber zunimmt. Auf die Gesamtwärmeabgabe üben Aenderungen in der Luftfeuchtigkeit zwar einen nachweislichen, aber keinen nennenswerthen

1) Rubner, Archiv f. Hygiene Bd. 11 S. 137—292. Die Beziehung der atmosphärischen Feuchtigkeit zur Wasserdampfabgabe. Stoffzersetzung und Schwankungen d. Luftfeuchtigkeit. Thermische Wirkungen d. Luftfeuchtigkeit.

Einfluss¹⁾ aus. Sodann fand Rubner, dass kleine und grosse Thiere, sowie auch der Mensch bei mittlerer Temperatur und Feuchtigkeit der umgebenden Luft einen annähernd gleich grossen Procentsatz ihres Körpergewichts als Wasser resp. als Wärme durch Wasserverdunstung abgeben. Gesteigert wird dieser Procentsatz durch Nahrungszufuhr und Arbeit. Diejenigen Resultate, welche in meinen Versuchen Aufschluss über die Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung geben, habe ich in der Tabelle XII zusammengestellt.

Tabelle XII.

No. des Versuchs	Mittleres Gewicht des Kaninchens in g	Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung				Feuchtigkeitsgehalt d. Luft in %	Mittlere Temperatur des Zimmers
		in Summa während 24 Stdn.	pro Kilo u. Stunde	in % bezogen auf das Gew. des Kaninch.	in % bezogen auf die Gesamtwärmeabgabe		
II	1787	25,07	0,585	1,403	15,69	71	17,27
III	1932	28,84	0,622	1,492	17,86	67	17,57
I	2151	23,13	0,448	1,075	14,73	71	17,63
IV	1703	17,65	0,432	1,036	16,23	60	19,09
VI	1673	17,57	0,438	1,050	16,78	41	19,25
V	2189	20,13	0,383	0,919	17,15	45	20,4
VII	2327	17,60	0,315	0,756	14,18	42	17,05

In Versuch II und III hat eine beträchtliche Vermehrung der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung stattgefunden. Dementsprechend ist auch die Wärmeabgabe pro Kilo und Stunde und 100 g Körpergewicht gesteigert. Die Vermehrung der Wasserabgabe hat aber in diesen Versuchen in annähernd gleichem Grade stattgefunden, als die Gesamtwärmeabgabe unter dem Einfluss der stärkeren Ventilation zunahm. Ich bin daher geneigt, diese Steigerung der Wasserverdunstung auch als eine Folgeerscheinung der stärkeren Ventilation des Calorimeters aufzufassen.

In Versuch I und in den Versuchen IV bis VII zeigte die Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung pro Kilo und Stunde und 100 g Körpergewicht nur geringe Unterschiede. Die Zahlen können wohl dazu dienen, für das Kaninchen die von Rubner am Menschen,

1) Bei zunehmender relativer Feuchtigkeit tritt eine geringfügige Verminderung der Wärmebildung, bei Abnahme eine entsprechende Vermehrung ein.

Hunde und Meerschweinchen gemachten Beobachtungen zu bestätigen. Eine gewisse Abhängigkeit der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung vom Körpergewicht fällt in den Versuchen IV bis VII auf und zwar insofern, als die grossen Thiere weniger Wärme pro Kilo und Stunde auf dem Wege der Wasserverdunstung abgeben als die kleineren. Es liegt mir indessen fern, auf Grund dieser Versuche diesen Befund zu verallgemeinern, da, wie weiter unten gezeigt werden wird, gerade die Wasserverdunstung durch Unruhe des Thieres leicht beeinflusst werden kann.

Bei einer Berechnung des Anthells der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung an der Gesamtwärmeabgabe ergibt sich in allen sieben Versuchen eine grosse Uebereinstimmung. Die Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung schwankt zwischen 14 und 17 % und beträgt im Mittel

16 %.

Der Einfluss des Feuchtigkeitsgrades der Luft und der umgebenden Temperatur auf die Wärmeabgabe tritt unter den von mir gewählten Versuchsbedingungen nicht deutlich in die Erscheinung.

2. Wärmeabgabe am Tage und während der Nacht.

Pettenkofer und Voit¹⁾ fanden bei ihren umfangreichen Stoffwechselversuchen am Menschen, dass während des Schlafes und in der Nacht weniger Kohlensäure ausgeschieden wurde, als am Tage. Voit²⁾ erklärte diesen Umstand mit folgenden Worten: „Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Ursache davon vor Allem in der während des Schlafes stattfindenden Muskelruhe, aber auch in dem Wegfall vieler Anregungen und Thätigkeiten des Nervensystemes zu suchen ist.“

Nach Feder³⁾, der die Stickstoffausscheidungen beim hungernen Hunde in zweistündlichen Perioden während 24 Stunden verfolgte, verlief die Eiweisszersetzung am Tage und während der Nacht sehr gleichmässig.

1) Pettenkofer u. Voit, Zeitschr. f. Biol. 1866, Bd. 2 S. 545.

2) Voit, Physiologie des allgemeinen Stoffwechsels in Herrmann's Handbuch der Physiologie S. 204.

3) Feder, Der zeitliche Ablauf der Zersetzung im Thierkörper. Zeitschrift f. Biol. Bd. 15 S. 531.

Rubner¹⁾ bestimmte am hungernden Hunde in dreistündlichen Perioden die Kohlensäureausscheidung während 24 Stunden. Er fand, dass sich die Kohlensäureausscheidung am Tage und während der Nacht verhielt, wie 100,6 : 100,0.

Es ist bekannt, dass die Eiweisszersetzung unabhängig ist von Kälte und Wärme, Ruhe und Arbeit. Nach den Versuchen von Pettenkofer und Voit (am Menschen) und Feder (am Hunde) dürfen wir eine Unabhängigkeit des Eiweisszerfalls vom Schlafen und Wachen annehmen. Die Versuche von Rubner am hungernden Hunde beweisen, dass die Kohlensäureausscheidung resp. Fett- und Kohlehydratzersetzung unter Umständen bei Nacht und bei Tag nicht verschieden zu sein braucht. Die von Voit für die Kohlensäureausscheidung beim Menschen abgegebene Erklärung würde auch jeder Zeit ausreichen, andere Befunde, als sie die Rubner'schen Versuche ergeben, beim Thiere zu erklären.

Ueber die Gesamtwärmeabgabe bei Tag und Nacht, besonders über den Antheil der Wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung einerseits und durch Wasserverdunstung andererseits, lassen die bisherigen Versuche kein Urtheil fällen.

Wie aus den Tabellen I bis VII hervorgeht, wurden meine Versuche nicht zu denselben Tagesstunden begonnen. Die Anfangszeit schwankte zwischen 5 und 10 Uhr Morgens, in Versuch VII wurde der Beginn auf 7 Uhr Abends verlegt. Ich habe bei der Berechnung der Werthe stets die ersten 12 Stunden den zweiten 12 Stunden als Tag und Nacht gegenüber gestellt. Durch eine besondere Berechnung, bei der ich die Wärmeabgabe in den Stunden von 6 bis 6 Uhr zu Grunde legte, überzeugte ich mich zuvor, dass der Beginn der Versuche zu den verschiedenen Tagesstunden auf den Ausfall der Resultate keinen bemerkenswerthen Einfluss nachweisen liess.

Die Resultate über die Wärmeabgabe bei Tag und bei Nacht sind in den Tabellen XIII und XIV zusammengestellt. Auch in diesen Tabellen werden neben den direct gewonnenen Grössen die auf 15° Umgebungstemperatur berechneten Werthe mitgetheilt.

1) Rubner, Zum 70. Geburtstage Carl Ludwigs 1887, S. 259.

Tabelle XIII.

No. des Versuches	Beobachtungen am Tage					Beobachtungen während der Nacht				
	Mittl. Gewicht des Kännchens in g	Mittl. Temperatur	Wärmeabgabe			Wärmeabgabe			Mittl. Temperatur	Mittl. Gewicht des Kännchens in g
			in Summa	durch Strahlg. und Leitung	durch Wasserverdunstg.	durch Wasserverdunstg.	durch Strahlg. und Leitung	in Summa		
II	1808	16,59	80,547	65,830	14,717	10,364	68,838	79,202	17,94	1763
III	1956	17,12	82,568	66,428	16,140	12,699	70,866	83,565	18,11	1909
I	2167	16,9	81,397	66,666	14,731	8,405	66,247	74,652	18,36	2137
IV	1684	19,45	52,974	45,060	7,914	9,735	46,082	55,817	18,61	1728
VI	1692	19,2	54,969	44,316	10,653	6,924	42,797	49,720	19,3	1655
V	2216	20,1	65,197	53,863	11,334	8,798	43,893	52,194	20,06	2159
VII	2355	17,03	61,233	52,384	8,849	8,759	54,198	62,957	17,06	2299
II			83,768	68,463	15,305	11,116	73,728	84,944	Werthe auf 15° Umgebungs-temperatur berechnet.	
III			86,902	70,078	16,824	13,683	76,358	90,041		
I			85,263	69,832	15,431	9,120	71,877	80,997		
IV			58,933	50,12	8,81	10,611	50,229	60,480		
VI			60,740	48,969	11,771	7,667	47,397	55,064		
V			73,509	60,730	12,779	10,029	49,468	59,497		
VII			64,294	55,003	9,291	9,219	57,043	66,262		

Tabelle XIV.

No. des Versuches	Beobachtungen am Tage					Beobachtungen während der Nacht				
	Mittl. Gewicht des Kännchens in g	Mittl. Temperatur	Wärmeabgabe			Wärmeabgabe			Mittl. Temperatur	Mittl. Gewicht des Kännchens in g
			in Summa pro Kilo und Stunde	durch Strahlung u. Leitg. pro Kilo und Stunde	durch Wasserverdunstg. pro Kilo und Stunde	durch Wasserverdunstg. pro Kilo und Stunde	durch Strahlung u. Leitg. pro Kilo und Stunde	in Summa pro Kilo und Stunde		
II	1808	16,59	3,713	3,037	0,676	0,485	3,259	3,744	17,94	1763
III	1956	17,12	3,523	2,833	0,688	0,554	3,097	3,651	18,11	1909
I	2167	16,9	3,123	2,557	0,566	0,328	2,583	2,911	18,36	2137
IV	1684	19,45	2,616	2,225	0,391	0,469	2,222	2,691	18,61	1728
VI	1692	19,2	2,707	2,183	0,524	0,348	2,155	2,503	19,3	1655
V	2216	20,1	2,542	2,116	0,426	0,339	1,676	2,015	20,06	2159
VII	2355	17,03	2,168	1,855	0,313	0,318	1,964	2,282	17,06	2299
II			3,861	3,158	0,703	0,520	3,495	4,015	Werthe auf 15° Umgebungs-temperatur berechnet.	
III			3,707	2,983	0,724	0,597	3,337	3,933		
I			3,271	2,679	0,592	0,355	2,803	3,158		
IV			2,911	2,475	0,436	0,511	2,422	2,933		
VI			2,991	2,412	0,579	0,386	2,316	2,772		
V			2,866	2,386	0,481	0,387	1,910	2,297		
VII			2,276	1,948	0,329	0,334	2,068	2,401		

Es zeigte sich, dass die Gesamtwärmeabgabe in drei Versuchen (III, IV, VII) während der Nacht diejenige am Tage um ein Weniges übertrifft. In drei weiteren Versuchen (I, VI, V) ist die Wärmeabgabe am Tage ziemlich beträchtlich grösser, als wie in der Nacht, in Versuch II schliesslich ist dieselbe nach Berücksichtigung der Umgebungstemperatur während des Tags und während der Nacht wohl als annähernd gleich gross anzusehen.

Keineswegs sind in Versuch I und in den Versuchen III bis VII die Unterschiede der Wärmeabgabe bei Tag und Nacht direct abhängig zu machen von einem Wechsel der Aussentemperatur, wie ein Blick auf die Tabelle lehrt, auch sind uns sonst keine äusseren Umstände aufgefallen, welche wir für die Schwankungen verantwortlich machen könnten. Im Besonderen sei noch hervor gehoben, dass die Kaninchen in dem Calorimeter ein durchaus gleichmässiges Verhalten zeigten.

Wir müssen daher aus den Resultaten meiner Versuche den Schluss ziehen, dass sich für die Gesamtwärmeabgabe während der Nacht und am Tage bei Kaninchen im Hungerzustande keine einheitliche Regel aufstellen lässt, dass dieselbe vielmehr von individuellen Umständen und Zufälligkeiten abhängig zu sein scheint, die wir nicht übersehen. Es ist nicht auszuschliessen, dass bei anderen Thierarten, z. B. beim Hunde, andere Verhältnisse anzutreffen sein werden.

Die Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung ist in fünf Versuchen am Tage beträchtlich grösser als wie in der Nacht; in Versuch VII besteht Gleichheit, nur in Versuch IV findet sich während der Nacht ein grösserer Wärmeverlust durch Wasserverdunstung als am Tage. Dieser Versuch wurde im Gegensatze zu den übrigen Versuchen Abends 7 Uhr begonnen. Es wird weiter unten bei der Besprechung der stündlichen Wärmeabgabe näher auseinander gesetzt werden, welche äusseren Einflüsse von Einwirkung auf die Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung sind. Eine Erklärung für das besondere Verhalten, welches die Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung in Versuch IV bei Tag und Nacht zeigt, wird alsdann nicht schwer fallen.

Meine Befunde deuten darauf hin, dass die Wasserabgabe bei Tag und bei Nacht zwar nicht zu differiren braucht (Versuch VII), im Allgemeinen aber am Tage höher zu sein pflegt, als in der Nacht. Ich habe ausserdem den Procentsatz der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung an der Gesamtwärmeabgabe berechnet und die Zahlen in Tabelle XV zusammengestellt.

Tabelle XV.

No. des Versuches	Wärmeabgabe			
	am Tage		in der Nacht	
	durch Strahlung und Leitung in %	durch Wasserverdunstung in %	durch Wasserverdunstung in %	durch Strahlung und Leitung in %
II	81,79	18,21	12,96	87,04
III	80,46	19,54	15,18	84,82
I	81,55	18,45	11,25	88,75
IV	85,05	14,95	17,41	82,59
VI	80,63	19,37	13,91	86,09
V	83,24	16,76	16,84	83,16
VII	85,56	14,44	13,91	86,09
Mittel	82,61	17,39	14,49	85,51

Man ersieht aus dieser Uebersicht, dass die Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung im Mittel

am Tage 17,39 %,

während der Nacht 14,49 %

beträgt. Für die Wärmeabgabe durch Leitung und Strahlung ergibt sich dementsprechend

am Tage 82,61 %,

während der Nacht 85,51 %.

Aus diesen Zahlen darf keineswegs der Schluss gezogen werden, dass die Wärmeabgabe durch Leitung und Strahlung während der Nacht gegenüber derjenigen am Tage in allen Versuchen auch absolut vermehrt ist. Nur in vier Versuchen (I, II, III, VII) ist eine absolute Vermehrung der Wärmeabgabe durch Leitung und Strahlung während der Nacht zu constatiren. In Versuch IV ist dieselbe bei Tag und Nacht gleich gross, in Versuch V und VI in der Nacht geringer als am Tage.

In den Versuchen II und III ist die Wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung während der Nacht in so hohem Grade vermehrt, dass dadurch die beträchtliche Verminderung der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung nicht nur nicht ausgeglichen, sondern sogar übercompensirt wird. Es ist im Anschluss an diese beiden Versuche der Gedanke nahe gelegt, dass unter Umständen während der Nacht eine gewisse Einsparung von Wasserdampf erfolgen kann, indem die Wärmeabgabe durch Leitung und Strahlung dafür vermehrt wird. Auch die Resultate in Versuch I und VII kann man in ähnlichem Sinne verwerthen. Jedenfalls gibt der mittlere Feuchtigkeitsgehalt der umgebenden Luft keine Erklärung für diese Befunde ab.

3. Stündlicher Verlauf der Wärmeabgabe.

a) Verhalten der Gesamtwärmeabgabe.

Bei der Betrachtung des stündlichen Verlaufs der Wärmeabgabe (Tabellen I bis VII a und b) ergibt sich zunächst, dass in sämtlichen sieben Versuchen im Verlaufe von 24 Stunden recht beträchtliche Schwankungen der Wärmeabgabe wahrzunehmen sind. Diese verursachen in den einzelnen Versuchen Unterschiede der stündlichen Wärmeabgabe von 27 %, selbst 31 %. Ferner sind diese Schwankungen in allen Versuchen bei Tage deutlich grösser, als während der Nacht, wie aus Tabelle XVI zu ersehen ist.

Tabelle XVI.

No. des Versuches	Am Tage beobachtete Schwankungen			Während der Nacht beobachtete Schwankungen		
	der Zimmer-temp.	der Wärmeabgabe pro Kilo	auf 100 bezogen	der Zimmer-temp.	der Wärmeabgabe pro Kilo	auf 100 bezogen
II	15,2—18,0	3,21—4,01	100—124,9	17,7—18,2	3,57—3,85	100—107,8
III	14,9—18,4	2,85—3,82	100—134,03	17,5—18,5	3,47—3,90	100—112,3
I	14,8—18,8	2,69—3,67	100—136,4	18,1—18,7	2,76—3,09	100—111,9
IV	18,2—20,4	2,41—2,86	100—118,6	17,9—19,1	2,53—2,94	100—116,2
VI	17,7—19,7	2,34—3,38	100—144,4	19,1—19,5	2,32—2,86	100—123,2
V	19,4—20,4	2,26—2,73	100—120,7	20,0—21,0	1,84—2,36	100—112,8
VII	16,3—17,3	1,85—2,46	100—132,9	17,0—17,2	2,10—2,53	100—120,47

Eine Gleichmässigkeit der Wärmeabgabe, wie sie bei Nacht¹⁾ in verschiedenen aufeinanderfolgenden Stunden beobachtet wurde, trat am Tage nicht annähernd in gleichem Maasse auf.

Bei Beurtheilung der stündlichen Wärmeabgaben werden wir zunächst als ein dieselbe vermuthlich in hohem Grade beeinflussendes Moment die Temperatur der umgebenden Luft in's Auge zu fassen haben, zumal dieselbe bei unseren Versuchen nicht gleichmässig gestaltet werden konnte. Rubner²⁾ hat durch Versuche von 24 stündlicher Dauer nicht nur die Angaben über den bedeutenden Einfluss der umgebenden Temperatur auf Wärmeproduction erhärtet, sondern auch den entsprechenden Einfluss auf die Wärmeabgabe mittelst der directen Calorimetrie nachgewiesen.

In meinen Versuchen lässt sich nun keineswegs ein gesetzmässiges Abhängigkeitsverhältniss zwischen der Temperatur und der stündlichen Wärmeabgabe durchgehend feststellen, wie dieses in langdauernden Versuchen (24 stündlichen) nachweisbar war. Nur in wenigen Versuchen zeigte sich im Verlauf von mehreren Stunden eine gewisse Abhängigkeit der stündlichen Wärmeabgabe von der Temperatur der umgebenden Luft.

In Versuch I wurde am Tage in der Zeit von 5 bis 12 Uhr entsprechend einer Temperaturzunahme von 14,8 bis 17,4°, gleichzeitig eine Abnahme der Wärmeabgabe beobachtet. Aehnliches wurde wahrgenommen in Versuch IV am Tage in der Zeit von 12 bis 6 Uhr und in Versuch II am Tage in den Stunden von 8 bis 5 Uhr, schliesslich in Versuch V während der Nacht in den Stunden von 11 bis 6 Uhr. Bei näherer Berechnung stellte sich aber heraus, dass die Schwankungen in der stündlichen Wärmeabgabe wohl kaum den gleichzeitigen Veränderungen der äusseren Temperatur entsprechen. Es würde sich z. B. in Versuch IV für ein Grad Aenderung in der Temperatur der umgebenden Luft ein Unterschied in der Wärmeabgabe von 14 % ergeben. Die Schwankungen

1) Grosse Gleichmässigkeit der stündlichen Wärmeabgabe findet sich während der Nacht vorübergehend in allen Versuchen, am Tage in Versuch II, I u. VII.

2) Rubner, a. a. O. (S. 31, 1) S. 285.

der Wärmeabgabe sind demgemäss zu grosse, als dass wir dieselben allein auf die gleichzeitigen, verhältnissmässig geringen Temperaturschwankungen beziehen könnten.

Ein gewisser Einfluss der Aussentemperatur auf die Wärmeabgabe scheint sich fernerhin auch dadurch auszusprechen, dass nämlich bei gleichem Verhalten der Schwankungen in der Umgebungstemperatur die Schwankungen der Wärmeabgabe in allen Versuchen am Tage bedeutend grösser sind als zur Nachtzeit. Ein Blick auf die Tabelle XVI zeigt jedoch, dass auch dieses Abhängigkeitsverhältniss durchaus kein gleichmässiges ist.

Weiterhin mag zur Erklärung der Schwankungen, welche ich bei Verfolgung der stündlichen Wärmeabgabe am Kaninchen beobachtete, der Umstand geltend gemacht werden, dass im Verlauf von 24 Stunden und zwar, wie bereits Voit hervorgehoben hat, am Tage mehr als während der Nacht, von aussen her mancherlei Anregungen des Nervensystems erfolgen, welche zur Auslösung von Thätigkeiten oder, was dasselbe sagen will, zur Bildung von Wärme Veranlassung geben. Diese Anregungen sind zum Theil durch Zufälligkeiten bedingt und erfolgen durchaus unregelmässig, zum Theil sind sie zurückzuführen auf Eingriffe, welche durch das Experiment geboten sind. Für die Grösse der Schwankungen sind nicht sowohl die Art und Intensität der erfolgten Anregung, als auch die individuellen Eigenschaften der Thiere maassgebend. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Gewöhnung an den Apparat bei den verschiedenen Thieren verschieden rasch eintritt. In Versuch I und in einigen Vorversuchen erfolgte sie offenbar besonders langsam.

Fast nach jeder Herausnahme der Thiere aus dem Calorimeter behufs Messung oder eines sonstigen Eingriffs liess sich bei Fortsetzung des Versuchs eine deutliche Veränderung der Wärmeabgabe nachweisen, sei es der Gesamtheit oder der einzelnen Componenten. Die Beeinflussung letzterer wird weiter unten besprochen werden.

Auf zwei Vorkommnisse möchte ich an dieser Stelle noch besonders aufmerksam machen; in Versuch I tritt während der Nachtzeit, trotz eines gleichzeitigen Abfalls der Zimmertemperatur von $18,7^{\circ}$ auf $18,1^{\circ}$,

in vier aufeinanderfolgenden Stunden (8 bis 12) keinerlei Veränderung der Gesamtwärmeabgabe ein.

Die auffallend geringe Abgabe während der ersten zwei Stunden in Versuch III legt den Gedanken nahe, dass erst von der dritten Stunde an der durch die Ventilationsgrösse bedingte Einfluss auf die Wärmeabgabe in die Erscheinung tritt. Es hat somit den Anschein, als ob sich das Thier durch physikalische Regulation eine Zeit lang vor einer vermehrten Wärmeabgabe zu schützen im Stande gewesen wäre. Dieses würde eine sehr bemerkenswerthe Erscheinung sein, welche ein weiteres Studium verdiente und in Versuchen über die stündliche Wärmeabgabe bei verschiedenen Temperaturen der umgebenden Luft zu beobachten wäre.

b) Verhältniss zwischen Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung und Wärmeabgabe durch Leitung und Strahlung.

Bei der Betrachtung des Antheils, welchen die einzelnen Componenten an der Gesamtwärmeabgabe nehmen, zeigt sich, dass sehr grosse Schwankungen zwischen der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung und derjenigen durch Strahlung und Leitung in allen Versuchen vorkommen. Bei näheren Berechnungen ergibt sich, dass der Antheil der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung schwankt

in Versuch	II	zwischen	25,9%	und	14,6%
"	"	III	"	21,5%	" 17,1%
"	"	I	"	31,6%	" 7,78%
"	"	IV	"	26,4%	" 11,5%
"	"	VI	"	21,5%	" 16,0%
"	"	V	"	26,1%	" 14,1%
"	"	VII	"	16,33%	" 11,8%.

Auf die grosse Bedeutung der Wasserbestimmung für die Beurtheilung der Gesamtwärmeabgabe ist bereits von Rubner in seinen letzten Arbeiten, besonders auch in der Kritik¹⁾ der calorimetrischen Versuche Rosenthal's, nachdrücklich hingewiesen.

Es erscheint jedoch nicht überflüssig, an der Hand des vorliegenden Materials noch einmal darauf aufmerksam zu machen,

1) Rubner, a. a. O. (S. 3, 1a u. S. 31, 1.)

dass bei calorimetrischen Messungen eine Vernachlässigung der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung durchaus unzulässig ist. Untersuchungen, welche es bisher an einer Wasserbestimmung haben fehlen lassen, erfahren eine dementsprechende Beschränkung der Beweiskraft.

Wenn wir nun das Verhältniss zwischen Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung und Wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung näher ins Auge fassen, so ergibt sich durchgehends, in einem Versuch allerdings mehr als in dem anderen, dass äussere Eingriffe jeglicher Art stets von hervorragendem Einfluss auf die Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung sind. Es lässt sich fast nach jeder Herausnahme aus dem Calorimeter zwecks Messung resp. Injection eine Steigerung der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung wahrnehmen. Dieselbe ist auch stets zu Anfang des Versuchs in bedeutendem Maasse zu constatiren (nur Versuch VII macht eine Ausnahme), so dass wir jeden Wechsel der äusseren Verhältnisse, selbst wenn das Thier sich 24 Stunden vorher in einem ähnlich ventilirten Raum wie das Calorimeter befand, als bedeutungsvoll für die Art und Menge der Wärmeabgabe ansehen müssen.

In Versuch I finden wir in den ersten Stunden neben einer beträchtlichen Vermehrung der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung auch eine Vermehrung der Gesamtwärmeabgabe resp. der Wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung. In Versuch IV ist die Gesamtwärmeabgabe in den ersten Tagesstunden vorwiegend durch Wasserverdunstung gesteigert. In Versuch II (Tags und Nachts), IV (Nachts) und VII (Tags und Nachts) ist in den ersten Stunden eine vermehrte Wasserabgabe bei gleichzeitig verminderter Wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung zu constatiren. Neben einer Vermehrung der Gesamtwärmeabgabe unter gleichzeitiger Betheiligung beider Componenten haben wir also eine Verminderung der Wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung und eine entsprechende Vermehrung der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung beobachtet, welche sich nicht durch den Feuchtigkeitsgehalt der Luft erklärt. Es kann also eine Vertretung der beiden die Gesamtwärmeabgabe bedingenden Componenten unter

einander stattfinden. Eine solche Vertretung können wir auch da beobachten, wo die Wärmeabgabe, wie oben angeführt, ziemlich gleichmässig verläuft. Dass somit die Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung ein activer Process ist, wie ihn Rubner¹⁾ bezeichnet hat, kann auch aus diesen Versuchen gefolgert werden.

Bei einer sorgfältigen Durchmusterung des Materials, welches meine Versuche für die Beurtheilung der Wärmeabgabe im Hungerzustande darbieten, kommt man zu der Anschauung, dass Schlüsse, welche man aus dem Vergleich der Wärmeabgabe weniger Stunden, geschweige denn einzelner Stunden zu ziehen beliebt, sehr mit Vorsicht aufzunehmen sind. Ebenso sind die Resultate von calorimetrischen Versuchen, in welchen Eingriffe von kurz dauernder oder geringer Wirkung geprüft werden sollen, sehr mit Kritik zu betrachten.

Ich möchte schliesslich noch der Vermuthung Ausdruck verleihen, dass wir wohl kaum eine dem grossen Wechsel der stündliche Wärmeabgabe genau entsprechende, stündliche Ausscheidung der Stoffwechselproducte erwarten können. Ich glaube unter Anderem hierin eine Erklärung dafür erblicken zu können, dass es bisher nur Rubner gelungen ist, das Gesetz von der Erhaltung der Kraft am lebenden Thiere nachzuweisen. Rubner erfüllte alle nothwendigen Versuchsbedingungen und wählte vor allen Dingen genügend lange Versuchszeiten (21 bis 22 Stunden), in welchen sich Verschiedenheiten zwischen Wärmeabgabe und Ausscheidung der Stoffwechselproducte ausgleichen konnten.

Ich komme auf Grund meiner Versuche zu folgenden Schlüssen:

1. Die Luftgeschwindigkeit im Calorimeter kann die Wärmeproduction und die Wärmeabgabe in hohem Grade beeinflussen.
2. Die Steigerung der Wärmeproduction bei grösserer Luftgeschwindigkeit ist aufzufassen als Ausdruck gesteigerter chemischer Regulation.

1) Rubner, a. a. O. (S. 31, 1) S. 224.

3. Die Grösse der Wärmeabgabe innerhalb 24 Stunden ist in demselben Maasse von der Körpergrösse und -Oberfläche abhängig wie die Wärmeproduction.

4. 16% der abgegebenen Wärme werden vom Kaninchen durch Wasserverdunstung gebunden.

5. Ueber die Grösse der Gesamtwärmeabgabe bei Tag und bei Nacht lässt sich für das Kaninchen keine bestimmte Regel aufstellen.

6. Die Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung ist am Tage beträchtlich grösser als während der Nacht (17% zu 14%), wenn während der Nacht keine besonderen äusseren Einflüsse auf das Thier einwirken.

7. Unter derselben Voraussetzung pflegt die Gesamtwärmeabgabe in ihrem stündlichen Verlauf bei Tage weit grössere Schwankungen zu zeigen als bei Nacht.

8. Die Schwankungen der Gesamtwärmeabgabe, sowie die Schwankungen der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung sind innerhalb 24 Stunden sehr bedeutende.

9. Durch jeden, auch den geringsten äusseren Eingriff kann eine Aenderung in der Wärmeabgabe hervorgerufen werden, sei es, dass die Gesamtwärmeabgabe oder deren Componenten im Einzelnen beeinflusst werden. Am auffälligsten ist die Steigerung der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung infolge Beunruhigung des Thieres durch äussere Eingriffe.

10. Die Wärmebindung durch Wasserverdunstung darf bei calorimetrischen Versuchen niemals vernachlässigt werden.

II. Beobachtungen am fiebernden Kaninchen.

Liebermeister¹⁾ fand durch Berechnung des Wärmeverlustes, welchen gesunde und fiebernde Menschen im Bade erlitten, „dass der Wärmeverlust bei Fieberkranken grösser ist als bei Gesunden“, und dass „im Fieber *ceteris paribus* mehr Wärme producirt wird, als im gesunden Zustande“.

1) Liebermeister, Beobachtungen und Versuche über die Anwendung des kalten Wassers bei fieberhaften Krankheiten. Leipzig 1863, S. 100 ff.

Leyden¹⁾ bestimmte mit einem Wassercalorimeter die Wärmeabgabe am Unterschenkel fiebernder Menschen. Er schloss aus seinen Versuchen:

1. „Die Wärmeabgabe ist im Fieber gesteigert“;
2. „ebensowohl bei constanter, als bei ansteigender oder abfallender Körpertemperatur“;
3. „demnach ist eine gesteigerte Wärmeproduction unzweifelhaft vorhanden“.

Senator²⁾ führte am fiebernden Hunde ebenfalls mit Hilfe eines Wassercalorimeters Messungen der Wärmeabgabe aus.

Auf Grund seiner Beobachtungen kam er zu folgenden Schlüssen: „Die Wärmeabgabe ist im Anfangsstadium des Fiebers niemals vermehrt, sondern eher vermindert, und infolge davon wird in diesen Zeiten höchstwahrscheinlich abnorm viel Wärme im Körper angehäuft.“ „Im weiteren Verlaufe und auf der Höhe des Fiebers zeigt die Wärmeabgabe wenigstens am Tage ähnliche Schwankungen wie die Kohlensäureabgabe.“ „Auch die Wärmebildung zeigt auf der Höhe des Fiebers beträchtliche Schwankungen, sie ist zu manchen Zeiten entschieden grösser, als in dem entsprechenden fieberfreien Zustande, zu anderen Zeiten wieder entschieden kleiner.“

In neuester Zeit hat Rosenthal³⁾ über Versuche berichtet, die er am fiebernden Menschen und Thiere angestellt hat. Aus seinen Thierversuchen ergibt sich, „dass im Stadium des Temperaturanstieges die Wärmeabgabe vermindert ist“ und zwar in dem Maasse, „dass wir daher berechtigt sind, die Temperaturerhöhung in diesen Fällen als Folge der Wärmeretention anzusehen“.

Die calorimetrischen Untersuchungen, welche zur Lösung physiologischer Fragen von Rosenthal am Thiere angestellt wurden, sind durch Rubner⁴⁾ einer Kritik unterzogen, in welcher vor Allem auf die ungenügende Auskunft über die Wärmeabgabe durch

1) Leyden, Untersuchungen über das Fieber. Deutsches Archiv f. klin. Med. Bd. 5 S. 273.

2) Senator, Untersuchungen über den fieberhaften Process und seine Behandlung. Berlin 1873, S. 90.

3) Rosenthal, Die Wärmeproduction im Fieber. Berl. klin. Wochenschrift 1891 No. 32 S. 785. Virchow's Festschrift I S. 413, 1891.

4) Rubner, a. a. O. (S. 3, 1a).

Wasserverdunstung hingewiesen wird. Die beiden Arbeiten, in denen Rosenthal Versuche über das experimentell beim Thiere erzeugte Fieber mittheilt, enthalten keine genaueren Angaben über diesen Punkt. Ich sehe daher von einer weiteren Kritik der letzten Mittheilungen Rosenthal's an dieser Stelle ab und verweise auf die Beurtheilung der früheren Versuche durch Rubner.

Auf Grund der partiellen calorimetrischen Untersuchungen, welche am Menschen angestellt wurden, die aber noch nicht als abgeschlossen gelten, gelangte Rosenthal bis jetzt zu folgendem Ergebniss: „Auf der Fieberhöhe ist die Wärmeabgabe grösser als im fieberlosen Zustande der Reconvalescenz.“ „Im Stadium des Fieberanstiegs ist die Wärmeabgabe geringer als auf der Fieberhöhe.“

Senator hat anerkannt, dass die bisherigen Versuche trotz ihrer grossen Zahl einer Lückenhaftigkeit nicht entbehren, „weil sie nicht den gesammten Fieberlauf umfassen, sondern nur einzelne Zeitabschnitte desselben, und weil vor Allem das Verhalten zur Nachtzeit ganz ausfällt.“ Ich war bemüht, diese Lückenhaftigkeit durch meine Versuche nach Möglichkeit auszufüllen.

Dass diese Arbeit mit grosser Schwierigkeit verknüpft sein muss, wird man erkennen, wenn man den Verlauf der stündlichen Wärmeabgabe mit seinen Schwankungen und Eigenthümlichkeiten ins Auge fasst, wie ihn die einzelnen Thiere in normalem Zustande darbieten.

Nachdem die Kaninchen 24 Stunden im fieberfreien Zustande beobachtet waren, wurde nach der Injection der Rothlauf-Bouillon-Cultur, die gelegentlich nach 12 bis 24 Stunden wiederholt wurde, die Beobachtung bei ununterbrochener Carenz fortgeführt.

Eine längere Beobachtungszeit, als 3 ½ Tage, war uns nicht möglich durchzuführen.

Die gefundenen Werthe wurden in einzelnen Versuchen dadurch untereinander vergleichbar gemacht, dass sie auf ein Kilo Thier umgerechnet wurden.

Ich habe mich in dem ersten Theil dieser Arbeit ausführlich darüber ausgelassen, dass uns ein absoluter Maassstab für den Vergleich der Wärmeabgabe an mehreren aufeinanderfolgenden Hungertagen fehlt, dass wir vielmehr auf eine Schätzung ange-

wiesen sind. Die Resultate meiner Versuche gestalten sich nun derart, dass Zweifel, wie ich im Einzelnen weiter unten zeigen werde, über die Bedeutung derselben nur in einem Versuch (VI) auftreten können.

Die Herausnahme des Kaninchens aus dem Calorimeter behufs Messung wurde möglichst beschränkt, da, wie ich gezeigt habe, durch diesen Eingriff eine Aenderung in der Wärmeabgabe hervorgerufen wird.¹⁾

1. Die Gesamtwärmeabgabe an den einzelnen Fiebertagen.

Für die Beurtheilung der Gesamtwärmeabgabe an den einzelnen Fiebertagen stehen mir fünf Versuche zur Verfügung. Die Beobachtung erstreckt sich in vier Fällen auf zwei Fiebertage, in einem Falle nur auf einen Fiebertag. Die Beobachtungszeit umfasst an drei Tagen 23 Stunden, an zwei Tagen 22 Stunden, an einem Tage 19 und an drei Tagen 17 Stunden. Bei der Berechnung der Wärmeabgabe in 24 Stunden wurden für die fehlenden Stunden die für die Tages- und Nachtzeit gesondert berechneten Mittelzahlen eingesetzt.

Ausser den von mir durch directe Calorimetrie gewonnenen Resultaten liegen als eine weitere Vervollkommnung des Materials Versuche von May vor.

May²⁾ bestimmte während der Carenz an Kaninchen, welche er ebenfalls durch Rothlauf-Bouilloncultiv in den fieberhaften Zustand versetzt hatte, die Gesamt-Calorienproduction auf indirectem Wege. Der Tabelle No. XVII, in welcher ich meine Versuche geordnet habe, lasse ich in Tabelle XVIII eine Zusammenstellung der Versuche May's folgen.

In der Tabelle sind unter dem ersten Tage sowohl die direct erhaltenen Werthe, als auch die auf die mittlere Zimmertemperatur des ersten Fiebertages corrigirten Werthe mitgetheilt. Für einen Grad Aenderung in der Temperatur der umgebenden Luft wurde nach Rubner 2,5 % der Wärmeabgabe in Rechnung gesetzt.

1) Rosenthal gibt an, dass er seine Katzen alle zwei Stunden gemessen habe; von einer besonderen Einwirkung dieses Eingriffes auf die Wärmeabgabe berichtet er nicht.

2) May, a. a. O.

In der letzten Rubrik habe ich die Wärmemenge, welche am Tage vor der Rothlauf-Injection abgegeben wurde, gleich 100 gesetzt und darauf die an den folgenden Tagen erhaltenen Werthe bezogen.

Tabelle XVII.

No. des Versuches		Mittl. Gew. d. Kaninchens	Temperatur d. Kaninchens	Temperatur des Zimmers	Wärmeabgabe				Wärmeabgabe pro Kilo und Stunde			
					durch Wasser- verdunstg.	durch Strahlung u. Leitg.	in Summa		durch Wasser- verdunstg.	durch Strahlung und Leitg.	in Summa	Wärme- abgabe auf 100 bezogen
II	1. Tag	1787	39,0	17,27	25,07	134,67	159,74	0,585	3,140	3,725		
	1. "	1787	39,0	17,05 ^{corr. auf}	25,08	135,64	160,72	0,585	3,162	3,747	100	
	2. "											
	3. "	1590	40,4	17,05	22,87	126,86	149,73	0,5993	3,3237	3,923	104,7	
IV	1. "	1703	39,0	19,09 ^{corr. auf}	17,65	91,14	108,79	0,432	2,220	2,652		
	1. "	1703	39,0	18,76 ^{corr. auf}	17,75	91,93	109,68	0,434	2,249	2,683	100	
	2. "	1625	41,7	18,76	19,17	109,29	128,46	0,491	2,803	3,294	122,7	
	3. "	1545	40,5	18,9	18,08	113,64	131,72	0,483	3,061	3,544	132,1	
VI	1. "	1673	38,4	19,25 ^{corr. auf}	17,57	87,11	104,68	0,438	2,169	2,607		
	1. "	1673	38,4	20,05 ^{corr. auf}	17,19	85,40	102,59	0,429	2,126	2,555	100	
	2. "	1606	41,0	20,05	14,94	81,77	96,71	0,3876	2,1214	2,509	98,2	
	3. "	1540	40,4	19,78	17,5	85,98	103,48	0,4734	2,3256	2,799	109,6	
V	1. "	2187	39,1	20,4 ^{corr. auf}	20,13	97,26	117,39	0,383	1,837	2,220		
	1. "	2187	39,1	19,4 ^{corr. auf}	20,63	99,69	120,32	0,3930	1,8990	2,292	100	
	2. "	2081	40,6	19,4	20,97	95,80	116,77	0,4198	1,9182	2,338	102,0	
	3. "	1978	41,3	19,5	21,05	98,83	119,88	0,4134	2,0816	2,525	110,2	
IVI	1. "	2327	38,6	17,02 ^{corr. auf}	17,60	106,59	124,19	0,315	1,908	2,223		
	1. "	2327	38,6	17,65 ^{corr. auf}	17,33	105,62	122,95	0,310	1,891	2,201	100	
	2. "	2229	40,7	17,65	20,62	104,32	124,94	0,3854	1,949	2,335	106,09	
	3. "	2139	40,7	18,0	22,52	118,96	141,48	0,4386	2,3174	2,756	125,2	

Ogleich die absoluten Werthe im Vergleich mit den Resultaten, die an fieberfreien Tagen gewonnen wurden, zum Theil eine Verminderung der Gesamtwärmeabgabe zeigten, so ergibt sich dennoch bei Berechnung der Mittelwerthe auf ein Kilo Thier und eine Stunde in drei Versuchen (IV, V, VII) während der ersten 24 Stunden nach der Injection eine deutliche Vermehrung der Wärmeabgabe. Während in diesen drei Versuchen auch das Ansteigen der Körpertemperatur

Tabelle XVIII.

Bezeichnung d. Kaninch.	No. des Ver- suchstages	Gewicht des Kaninch. in g	Temperatur		Wärmeproduction		Wärme- abgabe auf 100 bezogen	Bemerkung
			des Ka- ninchens	des Zimmers	in 24 Stdn.	pro Kilo und Stunde		
E	1	2480	$\left\{ \begin{array}{l} 39,2 \\ 39,5 \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} 18,5 \\ 18,8 \end{array} \right\}$ corr. auf	153,64	2,581	100	Rothlauf- Injection
	2	2378	$\left\{ \begin{array}{l} 39,7 \\ 41,2 \end{array} \right\}$	18,8	155,79	2,616	101,83	
	3	2270	$\left\{ \begin{array}{l} 41,2 \\ 40,7 \end{array} \right\}$	19,1	166,37	3,053	116,9	
H	1	3345	$\left\{ \begin{array}{l} 39,0 \\ 39,6 \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} 20,2 \\ 21,3 \end{array} \right\}$ corr. auf	216	2,687	2,612	Rothlauf- Injection
	2	3230	$\left\{ \begin{array}{l} 39,6 \\ 39,2 \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} 20,3 \\ 21,3 \end{array} \right\}$ corr. auf	210,1	2,616	100	
	3	3124	$\left\{ \begin{array}{l} 39,7 \\ 41,0 \end{array} \right\}$	21,3	207,5	2,675	105,1	
G	1	2838	$\left\{ \begin{array}{l} 38,5 \\ 38,2 \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} 18,3 \\ 19,3 \end{array} \right\}$ corr. auf	205,5	2,741	2,235	Rothlauf- Injection
	2	2737	$\left\{ \begin{array}{l} 38,2 \\ 38,6 \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} 20,3 \\ 19,3 \end{array} \right\}$ corr. auf	2241	2,241	100	
	3	2632	$\left\{ \begin{array}{l} 38,6 \\ 38,6 \end{array} \right\}$	19,3	148,85	2,183	103,2	
	4	2522	$\left\{ \begin{array}{l} 38,7 \\ 40,1 \end{array} \right\}$	19,0	147,94	2,25	114,1	
	5	2384	$\left\{ \begin{array}{l} 40,1 \\ 38,1 \end{array} \right\}$	20,0	150,52	2,287	134,7	
					154,38	2,55		
					164,62	2,879		

in den ersten 24 Stunden nach der Injection beobachtet wurde, trat die Temperatursteigerung mit gleichzeitiger Steigerung der Wärmeabgabe pro Kilo und Stunde in Versuch II erst am dritten Tage ein.

In Versuch VI verhält sich die Wärmeabgabe am fieberfreien Tage zu der am ersten Fiebertage wie 100 zu 98,2, es ist also eine Herabsetzung der mittleren Wärmeabgabe pro Kilo und Stunde vorhanden. Fraglich muss es bleiben, ob in diesem Falle thatsächlich eine pathologische Verminderung der Wärmeabgabe im Verhältniss zum Normaltage stattgefunden hat; denn der Unterschied ist sehr gering, und es wäre wohl möglich, dass derselbe auf die Abnahme des Gewichts und die damit einhergehende Abnahme der Wärmeproduction zu beziehen wäre.

In den zweiten 24 Stunden nach der ersten Injection finden wir gegenüber dem ersten Fiebertage eine deutliche Steigerung der absoluten Wärmeabgabe in drei Versuchen; in Versuch V ist die Wärmeabgabe am dritten Tage annähernd so gross wie am Normaltage; die Mittelzahlen pro Kilo und Stunde zeigen dagegen in allen Versuchen eine beträchtliche Steigerung, wir finden eine Zunahme der Wärmeabgabe von 100 zu 125, selbst zu 132.

Es ist bemerkenswerth, dass in drei Versuchen (VI, V, VII) während der ersten 24 Stunden nach der Injection, in welchen die Erhöhung der Körpertemperatur stattfand, die Steigerung der Wärmeabgabe bedeutend geringer ist als am zweiten Fiebertage, an welchem zwar auch noch zum Theil eine weitere Steigerung der Körpertemperatur statthabte, zum Theil aber auch wieder ein geringeres Sinken derselben zu beobachten war.

Die Wärmeproduction ist an fast allen Tagen nach der Injection deutlich gesteigert; denn wir haben der in 24 Stunden gemessenen Wärmeabgabe noch diejenige Wärmemenge hinzuzählen, welche der Temperaturerhöhung des Thierkörpers am Ende der 24 Stunden entspricht. Wir berechnen dieselbe aus der specifischen Wärme des Kaninchens (0,8), dem Gewicht am Ende der 24 Stunden und der Erhöhung der Körpertemperatur gegenüber dem fieberfreien Tage. Auf diese Weise finden wir auch, dass in Versuch VI, in welchem die Wärmeabgabe am ersten Fiebertage eine geringe Herabsetzung erfahren hat, die Wärmeproduction selbst eher gesteigert, als vermindert ist. Die gemessene Wärmeabgabe betrug am ersten Fiebertage 96,7 Calorien. Das Kaninchen hat nach Verlauf von 24 Stunden eine Temperatursteigerung um $2,6^{\circ}$ erfahren, das Endgewicht betrug 1575 g. Dementsprechend waren in dem Körper des Kaninchens 3,276 Calorien mehr angehäuft als am Normaltage. Die Wärmeproduction belief sich also auf 99,98 Calorien, im Mittel pro Kilo und Stunde 2,594 Calorien gegenüber 2,55 am Normaltage.

May hat in zweien seiner Versuche, die ich zum Vergleich herangezogen habe, durch Bestimmung der Stoffwechselproducte ebenfalls eine Steigerung der Wärmeproduction in den ersten 24 Stunden nach der Injection nachgewiesen. Bei Kaninchen G fand die

Temperatursteigerung zugleich mit einer stärkeren Wärmeproduction, wie in meinem zweiten Versuch, erst am dritten Tage statt. Es liegen somit sieben¹⁾ einwandsfreie Versuche am Kaninchen vor, in welchen unter gleichzeitigem Ansteigen der Körpertemperatur auch eine deutliche Steigerung der Wärmeproduction innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden nachweisbar war.

Der Antheil, welcher der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung und derjenigen durch Strahlung und Leitung an der Gesamtwärmeabgabe zufällt, ist aus der Tabelle XIX zu erschen.

Tabelle XIX.

No. des Versuches	Wärmeabgabe am					
	1. Tage		2. Tage		3. Tage	
	durch Wasserverdunstung in %	durch Strahlung u. Leitung in %	durch Wasserverdunstung in %	durch Strahlung u. Leitung in %	durch Wasserverdunstung in %	durch Strahlung u. Leitung in %
II	15,69	84,31			15,2	84,8
IV	16,23	83,77	14,92	85,08	13,72	86,28
VI	16,78	83,22	15,45	84,55	16,93	83,07
V	17,15	82,85	17,89	82,11	17,5	82,5
VII	14,18	85,82	16,49	83,51	15,99	84,01
Mittelzahlen	16,0 %	84,0 %	16,19 %	83,81 %	15,86 %	84,14 %

Man erkennt, dass das Verhältniss zwischen der Wasserverdunstung und der Wärmeabgabe durch Leitung und Strahlung genau das gleiche ist, als an den fieberfreien Tagen. Die Zahlen deuten mit anderen Worten darauf hin, dass die vermehrte Wasserverdunstung an den Fiebertagen im allgemeinen der Vermehrung der Gesamtwärmeproduction entspricht. Es verdient diese Thatsache besonders hervorgehoben zu werden, weil Leyden²⁾ aus seinen Wägungen am fiebernden Menschen schliesst, „dass die Wärmeproduction im Fieber auf etwa das doppelte des Normalen steigt, gleichzeitig die Wasserverdunstung entweder gar nicht oder nicht wesentlich gesteigert ist“.

Ein bestimmtes Urtheil über die Frage, ob der Gesamtorganismus im Fieber im Verhältniss wasserreicher geworden ist,

1) Nur Versuch VI macht eine Ausnahme.

2) Leyden, a. a. O. (S. 45, 1) S. 371.

wie es Leyden mit grosser Wahrscheinlichkeit aus seinen Wägungen am Menschen schliesst, lässt sich aus diesen meinen Zahlen natürlich nicht fällen.

2. Verhältnisse der Wärmeabgabe im Fieber während 12ständlicher Perioden.

Aus den Versuchen an fieberfreien, hungernden Kaninchen ging hervor, dass eine bestimmte Regel für Wärmeabgabe bei Tag und bei Nacht nicht aufzustellen war. Nur fanden wir, dass am Tage die Wasserverdunstung eine beträchtlich grössere war als in der Nacht. Für den fiebernden Organismus dürfen wir um so weniger erwarten, dass der Ablauf der Wärmeabgabe am Tag und während der Nacht sich nach einer bestimmten Regel vollzieht, als durch die Injection des Giftes ein die Wärmeproduction und Wärmeabgabe zeitlich beeinflussendes Moment hinzukommt. Diese Einwirkung tritt unabhängig von Tag und Nacht bald früher, bald später auf. Wir werden daher lediglich von dem Gesichtspunkte aus, den zeitlichen Verlauf des Fiebers näher kennen zu lernen, die Wärmeabgabe in kleineren, 12ständlichen Perioden betrachten, indem wir die 12 Tages- und 12 Nachtstunden gesondert einander gegenüber stellen. Die gefundenen Werthe auf eine bestimmte Temperatur der umgebenden Luft zu corrigiren, wurde in Versuch II, III, IV und VII für überflüssig erachtet. Die Temperaturverhältnisse in Versuch V und VI werden eine besondere Besprechung erfahren

(Siehe Tabelle XX und XXI auf S. 53 u. 54.)

In Versuch IV und VII konnte bereits in den ersten 12 Stunden nach der Injection mit ansteigender Temperatur eine deutliche Zunahme der mittleren Wärmeabgabe festgestellt werden. In Versuch II trat erst am dritten Tage die Temperatursteigerung ein, zu gleicher Zeit wurde aber auch hier eine geringe Zunahme der Wärmeabgabe beobachtet. In Versuch III ging die Zeit des Temperaturanstiegs, welcher sich in den zweiten 12 Stunden nach der Injection einstellte, leider für die Beobachtung verloren; es machte sich aber bereits in den ersten 12 Stunden nach der Injection eine beträchtliche Steigerung der Wärmeabgabe geltend, obgleich eine Steigerung der Körpertemperatur nicht nachgewiesen wurde.

Tabelle XX.

No. des Ver- suches	Zeit	Gewicht des Kaninch.	Temp. des Kaninch.	Temp. des Zimmers	Wärmeabgabe		
					durch Wasser- ver- dunstung	durch Strahlung und Leitung	in Summa
II	1. Tag	1808	39,0	16,59	14,72	65,83	80,55
	1. Nacht	1763	38,9	17,94	10,36	68,84	79,20
	2. Tag	1718	39,3	17,82	12,14	65,55	77,69
	2. Nacht		39,0				
	3. Tag	1623	39,5—40,4	16,63	12,97	59,65	72,62
	3. Nacht	1562	40,4	17,83	9,90	67,21	77,11
	4. Tag	1491	40,2—39,8	17,65	14,55	65,22	79,77
III	1. Tag	1956	39,3	17,12	16,14	66,23	82,57
	1. Nacht	1909	39,4	18,11	12,70	70,87	83,57
	2. Tag	1866	39,4	19,7	16,29	71,35	87,64
	2. Nacht						
IV	3. Tag	1783	41,7	20,2	15,35	73,35	88,70
	1. Nacht	1728	39,0	18,61	9,74	46,08	55,82
	1. Tag	1684	39,0	19,45	7,91	45,06	52,97
	2. Nacht	1641	40,8	18,96	9,81	54,32	64,13
	2. Tag	1607	41,7	18,50	9,36	54,98	64,34
	3. Nacht	1577	41,5	19,45	9,16	57,53	66,69
	3. Tag	1525	40,7	18,76	8,92	55,83	64,75
VI	1. Tag	1692	38,3	19,2	10,65	44,32	54,97
	1. Nacht	1655	38,6	19,3	6,92	42,80	49,72
	2. Tag	1621	40,1	20,3	8,76	40,44	49,20
	2. Nacht	1590	41,0	19,8	6,19	41,32	47,51
	3. Tag	1556	41,6	19,9	8,92	43,41	52,33
	3. Nacht	1522	40,6	19,3	8,58	42,58	51,16
	4. Tag	1483	40,0	19,6	10,25	42,70	52,95
V	1. Tag	2216	38,8	20,1	11,33	53,86	65,20
	1. Nacht	2159	39,4	20,6	8,80	43,39	52,19
	2. Tag	2101	39,4	19,84	11,89	49,68	61,57
	2. Nacht	2053	40,6	19,02	9,08	46,13	55,21
	3. Tag	2010	41,4	19,4	8,80	52,77	61,57
	3. Nacht	1955	41,3	19,65	12,25	46,07	58,32
	4. Tag	1902	40,0	19,6	8,47	52,34	60,81
VII	1. Tag	2355	38,6	17,03	8,85	52,38	61,23
	1. Nacht	2299	38,6	17,06	8,76	54,20	62,96
	2. Tag	2253	40,0—39,1	17,40	10,29	51,78	62,07
	2. Nacht	2212	39,4—40,7	17,59	10,33	52,54	62,87
	3. Tag	2160	41,1	18,2	12,13	59,00	71,13
	3. Nacht	2113	41,1	17,81	10,40	59,95	70,35
	4. Tag	2071	40,3	16,6	8,27	56,64	64,91

Tabelle XXI.

No. des Ver- suches	Zeit	Gewicht des Kaninchens	Temp. des Kaninch	Temperatur des Zimmers	Wärmeabgabe pro Kilo durch Wasser- und Stunde verlöst.	durch Strahlung u. Leitg. in Stunde	Wärme- abgabe auf 100 bezogen
II	1. Tag	1808	39,0	16,59	0,6764	3,0366	3,713
	1. Nacht	1763	38,9	17,94	0,4854	3,2586	3,744
	2. Tag	1718	39,3	17,82	0,5888	3,1812	3,770
	2. Nacht		39,0				
	3. Tag	1622	39,5—40,4	16,63	0,6667	3,0683	3,735
	3. Nacht	1580	40,4	17,83	0,5223	3,5447	4,067
	4. Tag	1491	40,2—39,8	17,65	0,8147	3,6473	4,462
III	1. Tag	1956	39,3	17,12	0,6886	2,8344	3,523
	1. Nacht	1909	39,4	18,11	0,5544	3,0966	3,651
	2. Tag	1869	39,4	19,7	0,7278	3,1882	3,916
	2. Nacht						
IV	3. Tag	1785	41,7	20,2	0,7172	3,4268	4,144
	1. Nacht	1728	39,0	18,61	0,4686	2,2224	2,691
	1. Tag	1684	39,0	19,45	0,3912	2,2247	2,616
	2. Nacht	1640	40,8	18,96	0,4987	2,7613	3,260
	2. Tag	1607	41,7	18,50	0,4858	2,8532	3,339
	3. Nacht	1577	41,5	19,45	0,4841	3,0109	3,525
	3. Tag	1525	40,7	18,76	0,4883	2,9657	3,454
VI	1. Tag	1692	38,3	19,2	0,5244	2,1826	2,707
	1. Nacht	1655	38,6	19,3	0,3484	2,1546	2,503
	2. Tag	1620	40,1	20,3	0,4521	2,0799	2,532
	2. Nacht	1589	41,0	19,8	0,3244	2,1676	2,492
	3. Tag	1555	41,6	19,9	0,4782	2,3258	2,804
	3. Nacht	1524	40,6	19,3	0,4694	2,3286	2,798
	4. Tag	1483	40,0	19,6	0,5763	2,3987	2,975
V	1. Tag	2216	38,8	20,1	0,4262	2,1158	2,542
	1. Nacht	2159	39,4	20,6	0,3394	1,6756	2,015
	2. Tag	2099	39,4	19,84	0,4710	1,9730	2,444
	2. Nacht	2053	40,6	19,02	0,3678	1,8742	2,242
	3. Tag	2008	41,4	19,4	0,3659	2,1881	2,554
	3. Nacht	1956	41,3	19,65	0,5225	1,9665	2,489
	4. Tag	1902	40,0	19,6	0,3718	2,2922	2,664
VII	1. Tag	2355	38,6	17,03	0,3132	1,8548	2,168
	1. Nacht	2299	38,6	17,06	0,3176	1,9644	2,282
	2. Tag	2253	40,0—39,1	17,40	0,3805	1,9155	2,296
	2. Nacht	2212	39,4—40,7	17,59	0,3896	1,9457	2,335
	3. Tag	2160	41,1	18,2	0,4678	2,2762	2,744
	3. Nacht	2113	41,1	17,81	0,4677	2,3073	2,775
	4. Tag	2017	40,3	16,6	0,3306	2,3084	2,639

In Versuch VI ist zweifellos in den ersten 12 Stunden nach der Injection bei steigender Körpertemperatur eine Abnahme der Wärmeabgabe vorhanden. Dieselbe dürfte wohl zum Theil dem Umstande zuzuschreiben sein, dass die umgebende Temperatur am ersten Tage um $1,1^{\circ}$ niedriger war als am zweiten Tage. Wäre es gestattet, diesen Unterschied durch eine Correctur (2,5% für 1°) auszugleichen, so würde sich das Verhältniss von 100 zu 93,3 auf 100 zu 96,3 verändern.

In Versuch V wurde bei kaum bemerkenswerther Temperatursteigerung des Kaninchens ebenfalls im Verlaufe der ersten 12 Stunden nach der Injection eine Verminderung der Wärmeabgabe von 100 zu 96,2 wahrgenommen. In diesem Falle würde der Unterschied durch eine Correctur des Werthes auf die Temperatur der umgebenden Luft noch um ein wenig vergrössert werden. Jedoch will es mir scheinen, dass bei diesem Versuche an dem fieberfreien Tage durch Zufall eine verhältnissmässig grosse Wärmeabgabe stattgefunden hat; denn in keinem anderen Versuche zeigt die Zunahme der Wärmeabgabe in 12stündlichen Perioden einen so schwankenden Verlauf wie in diesem. Während nämlich in allen anderen Versuchen ein ziemlich gleichmässiges Ansteigen der Wärmeabgabe stattfindet, bleibt die Wärmeabgabe in Versuch V während der Tagesstunden auffallend gering im Vergleich zu der Wärmeabgabe während der Nachtstunden. Diesen Versuch möchte ich daher für die Tagesstunden nicht als vollgültig in Betracht ziehen.

Während der zweiten 12 Stunden nach der Injection ist in Versuch IV, V, VII unter gleichzeitigem weiteren Steigen der Körpertemperatur eine ausgesprochene Vermehrung der Wärmeabgabe vorhanden. In Versuch VI ist die Wärmeabgabe während der zweiten 12 Stunden nach der Injection der während der ersten 12 Nachtstunden abgegebenen Wärmemenge gleichzusetzen, während zu gleicher Zeit die Körpertemperatur um einen Grad steigt.

Im weiteren Verlauf zeigt sich in allen Versuchen übereinstimmend bis zum vierten Tage, d. h. bis zum dritten Fiebertage, eine beträchtliche Steigerung der Wärmeabgabe. Meistens war in den dritten 12 Nacht- oder vierten

12 Tagesstunden ein geringer Temperaturabfall zu verzeichnen. Eine besondere Steigerung der Wärmeabgabe während dieser Zeit konnte nicht wahrgenommen werden. Dagegen ist die Steigerung der Wärmeabgabe am vierten Tage in Versuch II, zu welcher Zeit ein dem **Collaps** vergleichbarer Temperaturabfall sich einstellte, eine bemerkenswerthe.

Die **Wärmeproduction** ist in vier Versuchen, II, III, IV, VII, entsprechend der Steigerung der Wärmeabgabe und der Körpertemperatur bereits zur Zeit des Temperaturanstiegs zweifellos als vermehrt gegenüber der Norm anzunehmen. Auch in Versuch VI ist dieselbe bereits in den ersten 12 Stunden nach der Injection wohl eher als gesteigert, denn vermindert anzusehen. Wenn wir die im Körper des Kaninchens durch Steigerung der eigenen Temperatur aufgespeicherte Wärmemenge (2,31 Calorien) und die durch Differenzen der umgebenden Temperatur bedingte Verminderung der Wärmeabgabe in Rechnung setzen, so würden wir im Mittel eine Wärmeproduction von 2,711 Calorien, gegenüber einer Wärmeproduction von 2,707 Calorien am Normaltage, erhalten. Jedoch sei ausdrücklich bemerkt, dass sich in diesem Falle kein unbedingt sicheres Urtheil fällen lässt.

Als bemerkenswerth verdient noch hervorgehoben zu werden, dass auch in der Fieberzeit die Wasserverdunstung während der Nachtstunden im Mittel deutlich geringer ist, als während der Tagesstunden. Es scheint übrigens, dass, je länger der Versuch dauert, eine um so grössere Ausgleichung dieser Erscheinung eintritt. Diese Veränderung der Verhältnisse erklärt sich wahrscheinlich durch den gleichmässig apathischen Zustand, der sich im Verlauf der Erkrankung bei den Thieren allmählich einstellt. Aus der Tabelle XXII ist das Verhältniss der Wasserverdunstung zur Wärmeabgabe durch Leitung und Strahlung zu ersehen.

(Siehe Tabelle XXII auf S. 57.)

3. Stündlicher Verlauf der Wärmeabgabe am fiebernden Kaninchen.

Ich habe gezeigt, dass der stündliche Verlauf der Wärmeabgabe bei normalen Kaninchen grosse Schwankungen aufweist, und dass

Tabelle XXII.

No. des Versuches	Wärmeabgabe am						Wärmeabgabe während der					
	1. Tage		2. Tage		3. Tage		4. Tage		1. Nacht		2. Nacht	
	durch Wasserverdunstung in %	durch Strahlung und Leitung in %	durch Wasserverdunstung in %	durch Strahlung und Leitung in %	durch Wasserverdunstung in %	durch Strahlung und Leitung in %	durch Wasserverdunstung in %	durch Strahlung und Leitung in %	durch Wasserverdunstung in %	durch Strahlung und Leitung in %	durch Wasserverdunstung in %	durch Strahlung und Leitung in %
II	18,27	81,73	15,62	84,38	17,86	82,14	18,24	81,76	13,08	86,92	12,83	87,17
III	19,64	80,36	18,58	81,42	17,30	82,70			15,19	84,81		
IV	14,93	85,07	14,56	85,44	13,77	86,23			17,45	82,55	15,29	84,71
VI	19,44	80,56	17,77	82,23	17,06	82,94	19,35	80,65	13,91	86,09	13,02	86,98
V	17,37	82,63	19,31	80,69	14,29	85,71	13,92	86,08	15,86	84,14	16,49	83,51
VII	14,45	85,55	16,57	83,43	17,05	82,95	12,70	87,30	13,91	86,09	16,43	83,57
Mittelzahlen	17,33	82,67	17,07	82,93	16,22	83,78	16,05	83,95	15,07	84,93	15,3	84,7

besonders die Wasserverdunstung durch äussere Eingriffe in hohem Grade verändert werden kann.

Zunächst ist festzustellen, dass während des Fieberanstieges, sowie auf der Höhe des Fiebers nach allen äusseren Eingriffen zum Theil ein Einfluss auf die Gesamtwärmeabgabe, besonders aber auch auf die Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung, ähnlich wie im normalen Zustande beobachtet werden konnte.

Es verdient als bemerkenswerth ferner hervorgehoben zu werden, dass in vier von fünf Versuchen (II., IV., V. und VII.) die Schwankungen der Gesamtwärmeabgabe während des Temperaturanstieges einen theilweise sehr beträchtlich höheren Grad erreichen, als in der entsprechenden Zeit des Normalversuchs.

Senator¹⁾ hat, im Anschluss an seine Versuche,

1) Senator, a. a. O. S. 153.

die er am Hunde anstellte, zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass „während des Fiebers beträchtliche Schwankungen der Wärmebildung über und unter die Norm vorkommen können“. Er beobachtete ausserdem mit einem Fernrohr die Ohrgefässe von Kaninchen im normalen und fieberhaften Zustande und kam zu dem Schluss, „dass die Verengerung und Erweiterung der Gefässe schon etwa zwei bis drei Stunden nach Beginn des Fiebers stärker als gewöhnlich im gesunden Zustande sind“. Senator glaubte damit den Beweis erbracht zu haben, „dass in der That auf der Höhe des Fiebers die Gefässe der Haut weder in lähmungsartiger Erschlaffung, noch in tetanischer Contraction dauernd verharren, sondern sich abwechselnd oft ohne jede erkennbare äussere Veranlassung erweitern und verengern“.

Meine calorimetrischen Untersuchungen stehen mit der Beobachtung Senator's in gutem Einklang. Sie beweisen, dass während des Fieberanstiegs eine grössere Labilität der Wärmeabgabe als in der Norm vorhanden ist.

Dabei wurde in zwei Versuchen (Versuch II und V zur Zeit des Fieberanstiegs vorübergehend während einzelner Stunden eine geringere Wärmeabgabe beobachtet, als diese zuvor an einem Normaltage gefunden wurde. In den übrigen Versuchen wurden die stärkeren Schwankungen durch eine Steigerung der Wärmeabgabe hervorgerufen.

(Siehe Tabelle XXIII auf S. 59.)

III. Wesen des Fiebers.

Während die älteren Autoren¹⁾ als Ursache der Temperatursteigerung im Fieber eine gesteigerte Oxydation annahmen, vertrat Traube²⁾ die Ansicht, dass im Fieber der Wärmeverlust verringert werde, „dieses hat seinen Grund in einer Contraction der kleinen und kleinsten Arterien“.

1) Vergl. die Litteraturzusammenstellung bei Raabe: Die modernen Fiebertheorien. Gekrönte Preisschrift. Berlin 1894.

2) Traube, Zur Fieberlehre. Ges. Abhandlungen S. 637 u. 679, 1871.

Tabelle XXIII.¹⁾

No. des Versuches	No. des Versuchstags	Am Tage beobachtete Schwankungen			Während der Nacht beobachtete Schwankungen		
		der Temperatur	der Wärmeabgabe pro Kilo	der Wärmeabgabe auf 100 bezogen	der Temperatur	der Wärmeabgabe pro Kilo	der Wärmeabgabe auf 100 bezogen
II	1	15,2—18,0	3,21—4,01	100—124,9	17,7—18,2	3,57—3,85	100—107,8
	2	17,2—18,5	3,10—4,11	100—132,5			
	3	14,5—18,3	2,68—4,26	100—158,9	17,6—18,2	3,82—4,29	100—112,3
	4	16,7—17,6	4,53—4,81	100—106,18			
III	1	14,9—18,4	2,85—3,82	100—134,03	17,5—18,5	3,47—3,90	100—112,3
	2	18,7—20,4	3,52—4,52	100—128,4			
	3	18,5—22,6	3,75—4,66	100—124,2			
IV	1				17,9—19,1	2,53—2,94	100—116,2
	2	18,2—20,4	2,41—2,86	100—118,6	17,1—20,4	2,55—3,71	100—145,5
	3	17,6—19,2	3,08—3,52	100—114,2	18,6—20,1	3,37—3,77	100—111,8
	4	17,5—19,4	3,15—3,70	100—117,4			
VI	1	17,7—19,7	2,34—3,38	100—144,4	19,1—19,5	2,32—2,86	100—123,2
	2	20,0—20,5	2,18—2,79	100—127,9	19,6—20,1	2,21—2,77	100—125,3
	3	19,3—20,1	2,63—3,24	100—123,6	19,2—19,7	2,64—2,99	100—113,2
	4	19,2—19,8	2,73—3,37	100—121,2			
V	1	19,4—20,4	2,26—2,73	100—120,8	20,0—21,0	1,84—2,36	100—128,2
	2	19,2—20,6	2,32—2,66	100—114,6	18,2—20,1	1,99—3,04	100—152,7
	3	19,0—19,6	2,04—2,91	100—142,6	19,3—20,0	2,00—2,80	100—140,0
	4	19,1—20,2	2,51—2,98	100—118,7			
VII	1	16,3—17,3	1,85—2,46	100—132,9	17,0—17,2	2,10—2,53	100—120,47
	2	17,3—17,7	1,88—2,78	100—147,8	17,8—18,2	1,93—2,82	100—146,1
	3	17,9—18,7	2,28—3,51	100—153,9	17,2—18,1	2,51—2,97	100—118,3
	4	16,6—16,9	2,19—2,87	100—131,05			

Liebermeister²⁾ kommt auf Grund der Bestimmung der CO₂-Ausscheidung und der Wärmeabgabe im Bade zu der Ansicht, „dass zum Wesen des Fiebers nothwendig sowohl die höhere Körpertemperatur als auch die Steigerung der Wärmeproduction gehört“. „Die Wärmeregulation ist im Fieber auf einen höheren Temperaturgrad eingestellt.“ „Auch die Regulation der Wärmeproduction nach

1) Die unterstrichenen Zahlen entsprechen der Zeit des Temperaturanstiegs, die in Versuch III für die Beobachtung verloren ging.

2) Liebermeister, Ueber Wärmeregulirung und Fieber. Sammlung klin. Vortr. 1871 No. 19.

dem Wärmeverlust findet bei Kranken ebenso statt wie beim Gesunden“, jedoch ist dieselbe beeinträchtigt.

Nach Senator¹⁾, der sein Urtheil auf die Untersuchungen des Stoffwechsels am fiebernden Menschen und Hunde, sowie auf calorimetrische Messungen am Hunde stützt, hat „die Haut ihre Fähigkeit, die Körpertemperatur durch ihren wechselnden Gehalt an Blut und Wärme zu reguliren, im Fieber nicht verloren; ihre Wirksamkeit wird aber beeinträchtigt dadurch, dass unter dem Einfluss der Fieberursache eine abnorme Erregbarkeit und Reizung ihrer Gefässe eintritt, wodurch diese von Anfang der Fieberentwicklung an zeitweise sich allgemein oder theilweise verengern und dadurch die Ausgleichung des vorhandenen Wärmeüberschusses verhindern“.

„Die erhöhte Temperatur im Fieber kommt also zu Stande durch ein Missverhältniss zwischen der abnorm vermehrten Bildung und der nicht in demselben Grade vermehrten Abgabe von Wärme. Dabei kann die Abgabe auf der Höhe des Fiebers immer grösser als normal und zeitweise sogar grösser als die fieberhafte Wärmebildung sein. Das Missverhältniss tritt also nicht in jeder Fieberphase gleich stark hervor und setzt nothwendig ein jeder Fieberhitze vorangehendes, pyrogenetisches Stadium der Anhäufung von Wärme voraus, sowie sie durch ein Defervescenz-Stadium mit gerade umgekehrtem Verhalten beendet wird.“

Claude-Bernard²⁾ spricht sich in seinen Vorlesungen während der Jahre 1871—72 dahin aus, dass das Fieber eine Steigerung der physiologischen Verbrennungs-Processen in Folge der Erregung der Nerven sei, welche diese Vorgänge reguliren, „im Besonderen der wärmeerzeugenden Nerven, welche vom Rückenmark entspringen, aber nicht in Folge einer Lähmung der gefässerweiternden Nerven“.

Leyden und A. Fränkel³⁾ kommen auf Grund ihrer Versuche am Hunde, sowie auf Grund der partiellen calorimetrischen Mess-

1) Senator, a. a. O. S. 167.

2) Claude-Bernard, Vorlesungen über die thierische Wärme. Deutsch von Schuster. Leipzig 1876, S. 379 ff.

3) Leyden u. Fränkel, Ueber den respiratorischen Gasaustausch im Fieber. Virchow's Archiv Bd. 76 S. 136.

ungen am Menschen, welche der erste der beiden Autoren angestellt hat, zu der Ueberzeugung, dass der Organismus das Plus von Wärme, welches er über das zur Erhaltung der Normaltemperatur nöthige Maass erzeugt, in Folge einer durch das Fieber bedingten Aenderung der Wärmeregulation nicht im Stande ist, an die Umgebung loszuwerden.

Finkler¹⁾ hat sich im Anschluss an seine zahlreichen Bestimmungen der CO₂-Ausscheidungen und O₂-Zehrung am Meerschweinchen die Ansicht gebildet, dass das Fieber eine Neurose, im Wesentlichen eine Erkrankung des die Temperatur regulirenden Nervensystems sei. Dabei nimmt Finkler „eine Steigerung der Oxydation zur Erreichung der fieberhaften Temperaturhöhe, als beim Verweilen auf derselben als Veranlassung an“.

In neuerer Zeit hat die Anschauung Traube's durch die Untersuchungen Maragliano's²⁾ „eine Erklärung, in manchen Punkten, nämlich der Beziehung der vasculären Erscheinungen zum Frostanfall, eine Berichtigung erfahren“. Maragliano untersuchte das Verhalten der Gefässe im Fieber mit Hilfe des Plethysmographen von Mosso. Er fand, „dass die Blutgefässe der Haut sich zu verengern begannen, wenn noch keine Temperatursteigerung wahrnehmbar, dass mit dem Fortschreiten der Gefässcontraction die Temperatur zu steigen anfängt, dass letztere ihren Höhepunkt erreicht zur selben Zeit, als erstere zu ihrem Maximum gelangt; dass ferner dem Sinken der Temperatur die Erweiterung der Blutgefässe vorangeht, und wenn die Dilatation am grössten ist, sehen wir die Temperatur in die Norm zurückkehren“.

Maragliano stellte seine Versuche meistens an Patienten mit intermittirendem Fieber (Wechselfieber, Typhus) an, einmal untersuchte er die Gefässe während des Fieberabfalls bei infectiösem Magenkatarrh. Ueber das Verhalten der Gefässe bei continuirlichem Fieber gestatten also die Untersuchungen Maragliano's zunächst noch keinen näheren Schluss zu ziehen. Leider fehlt es uns auch noch, um die Versuche Maragliano's zur Lösung der

1) Finkler, a. a. O. S. 151 ff.

2) Maragliano, Das Verhalten der Blutgefässe im Fieber und bei Antipyrese. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 14 S. 309.

Fieberfrage nachdrücklich verwerthen zu können, an der nöthigen Grundlage, welche uns berechtigte, bestimmte genau zu bemessende Beziehungen zwischen Gesamtwärmeabgabe (inclusive Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung) und dem Verhalten der Gefäße anzunehmen.

Die übrigen von mir citirten Autoren sprechen sich mehr oder weniger gegen die Traube'sche Theorie aus; es wird von allen eine Betheiligung des Nervensystems bei der Entstehung des Fiebers anerkannt, zugleich aber auch eine Steigerung der Wärmeproduction angenommen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass sich im Verlauf des Fiebers eine Steigerung der Wärmeproduction und der Wärmeabgabe einstellen kann. Die Zunahme der Wasserabgabe kann dabei gleichen Schritt halten mit der Zunahme der Gesamtwärmeproduction. Diese Behauptung wird ausnahmslos und einwandsfrei durch meine Versuche bewiesen.

Meine Resultate lassen sich in Einklang bringen mit den Befunden von Liebermeister, Leyden und Rosenthal, welche bei directer Messung an Menschen die Wärmeabgabe vermehrt fanden. Ferner mit den Resultaten derjenigen Autoren, welche, wenn auch zum Theil nur vorübergehend, eine Vermehrung der CO₂-Ausscheidungen oder eine Vermehrung der CO₂-Ausscheidungen und O₂-Zehrung im Fieber finden. Leyden und Fränkel machten diese Beobachtung am fiebernden Hunde, Colosanti¹⁾ und Finkler am Meerschweinchen, Lilienfeld²⁾ am Kaninchen.

Ebenso fanden Kraus³⁾ und Loewy⁴⁾, welche nach der Zuntz-Geppert'schen Methode am fiebernden Menschen Versuche anstellten, bei recentem Fieber eine Steigerung der oxydativen Vorgänge.

1) Colosanti, Ueber den Einfluss der umgebenden Temperatur auf den Stoffwechsel. Pflüger's Archiv Bd. 14 S. 125.

2) Lilienfeld, Untersuchungen über den Gaswechsel fiebernder Thiere. Pflüger's Archiv Bd. 32 S. 293, 1883.

3) Kraus, Ueber den respiratorischen Gasaustausch im Fieber. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 18 S. 160.

4) Loewy, Stoffwechseluntersuchungen im Fieber und bei Lungenaffectionen. Virchow's Archiv Bd. 126 S. 218.

Von Naunyn¹⁾ und Finkler²⁾, welche am Hund, bezüglich am Meerschweinchen, experimentell Fieber erzeugten, wurde beobachtet, dass eine Steigerung des Eiweisszerfalles resp. der Oxydationsvorgänge unter Umständen bereits nachweisbar ist, bevor eine Steigerung der Temperatur durch das Thermometer zu erkennen ist. Ähnliches wurde von mir wahrgenommen.

In Versuch II tritt erst am zweiten Tage nach der Injection dauernde Temperatursteigerung bei dem betreffenden Kaninchen ein. Trotzdem war bereits in den ersten zwölf Stunden nach der Injection eine Steigerung der Wärmeabgabe von 100 zu 100,5 zu beobachten.

In Versuch VII trat die dauernde Temperatursteigerung erst im Verlauf der zweiten zwölf Stunden nach der Injection ein. In den ersten zwölf Stunden wurde indessen schon bei nur vorübergehender Temperatursteigerung eine deutliche Steigerung der Wärmeabgabe von 100 zu 105,9 constatirt.

Auf der anderen Seite scheint es mir nach dem bis jetzt vorliegenden Material nicht ausgeschlossen, dass eine Temperatursteigerung bei annähernd gleichbleibender Wärmeproduction nicht auch allein durch verminderte Wärmeabgabe eintreten könnte.

Für die Möglichkeit eines solchen Vorganges scheint mir das Resultat des Versuchs VI³⁾ zu sprechen. Die Wärmeabgabe bleibt in diesem Versuch, nachdem die durch die verschiedenen Zimmertemperaturen bedingten Differenzen ausgeglichen, während der ersten zwölf Stunden nach der Rothlauf-Injection hinter der Wärmeabgabe in den ersten zwölf Stunden des fieberfreien Tages deutlich zurück (96,3 : 100). Dabei stieg die Körpertemperatur von 38,6° auf 40,1°. Rechnet man nun die im Thierkörper angehäuften Wärmemenge, welche zur pathologischen Steigerung der Körpertemperatur geführt hat, der abgegebenen Wärmemenge hinzu, so ergibt sich ein annäherndes Gleichbleiben der Wärmeproduction.

1) Naunyn, Reichert's u. Du Bois' Arch. f. Anat. u. Physiol. 1870 S. 159 ff.

2) Finkler, a. a. O. S. 143.

3) Vergl. S. 54, 55 u. 56; wie das Sinken der Wärmeabgabe in den ersten beiden Stunden nach der Injection in Versuch II zu deuten ist, muss eine offene Frage bleiben.

Auch bei den experimentellen Untersuchungen Senator's¹⁾ stellte sich heraus, „dass das Eiterfieber beim Hunde mit der Zurückhaltung der Wärmeabgabe anfängt“.

Loewy²⁾ fand bei seinen Gaswechselversuchen (Zuntz-Gepert'sches Verfahren) an tuberculösen Menschen, die er durch Tuberculin in den fieberhaften Zustand versetzte, dass eine Steigerung des Sauerstoffverbrauchs im Fieber „nicht in allen, aber doch in den meisten Fällen zu constatiren ist“; „sie ist jedoch eine in ihrer Intensität ziemlich schwankende, durch die Höhe der Körpertemperatur als solche nicht direct bedingte und überhaupt verhältnissmässig nur sehr geringe“. Verhältnissmässig hoch ist der Sauerstoffverbrauch, wenn vermehrte Athemanstrengung vorliegt, oder das Stadium incrementi mit raschem Anstieg erfolgt, oder aber wenn sich beides vereint vorfindet.

Kraus³⁾ zeigte, dass Fieber am Menschen möglich ist, „ohne dass die oxydativen Prozesse, gemessen durch die Bestimmungsgrössen des Gaswechsels nach dem Zuntz'schen Verfahren, ersichtlich gesteigert sind“. „Ein solches Verhalten zeigen längere Zeit fiebernde, partieller Inanition verfallene Menschen.“

Schon die soeben besprochenen Verhältnisse weisen darauf hin, dass die Steigerung der Körpertemperatur im Fieber vorwiegend auf einer Störung der Wärmeregulation beruht.

Für diese Auffassung spricht ferner der Umstand, dass sich auch kleine Thiere trotz ihrer verhältnissmässig grossen Oberfläche nicht der geringen Wärmemengen entledigen können, welche zur fieberhaften Temperatursteigerung führen.

Durch die Untersuchungen, welche Rubner⁴⁾ am Hunde (Gewicht ca. 4,7 kg) ausführte, wissen wir, dass durch die Nahrungszufuhr⁵⁾

1) Senator, a. a. O. — 2) Loewy, a. a. O. — 3) Kraus, a. a. O.

4) Rubner, a. a. O. (S. 31) S. 285 u. 200 ff.; Schwankungen der Luftfeuchtigkeit bei hohen Temperaturen in ihrem Einfluss auf den thierischen Organismus. Archiv f. Hygiene Bd. 16 S. 101.

5) Von Leyden und Fränkel wurde bereits in gleichem Sinne auf die vermehrte CO₂-Ausscheidung nach Nahrungszufuhr (Pettenkofer und Voit) hingewiesen; a. a. O. S. 181.

die Wärmeabgabe bei gleichbleibender Aussentemperatur in hohem Maasse gesteigert wird. Rubner's Hund zeigte eine Zunahme der Wärmeabgabe im Hunger und bei Nahrungszufuhr von 100 zu 141,6 und 100 zu 142. Bei hoher Umgebungstemperatur (35°) und einer Nahrungszufuhr (Speck), durch welche annähernd Körpergleichgewicht erzielt wurde, war der Hund im Stande, auf dem Wege der Wasserverdunstung durch vermehrte Athmung eine derartige Wärmemenge abzugeben, dass seine Körpertemperatur nicht gesteigert wurde. Trotz Zunahme der Luftfeuchtigkeit von 9,3% auf 30,0% blieb die Wasserverdunstung gleich gross. Es wurden durch Strahlung und Leitung nur 39%, durch Wasserverdunstung 71% Wärme abgegeben. Die erhöhte Athemarbeit drückte sich bei zunehmender Feuchtigkeit durch Steigerung der Gesamtwärme-production aus.

Wenn man in Anbetracht solcher Zahlen bedenkt, dass sich ein Kaninchen im Fieber nicht der verhältnissmässig geringen Wärmemenge zu entledigen vermag, um die Steigerung seiner Körpertemperatur zu vermeiden, so spricht dieser Umstand unbedingt für eine Störung der Wärmeregulation, und zwar in dem Sinne, dass für den Organismus die Möglichkeit verloren gegangen ist, seine Körpertemperatur auf dem Grad, der ihm unter normalen Verhältnissen, d. h. bei normal functionirender Regulation, eigenenthümlich ist, zu erhalten.

Liebermeister spricht sich dahin aus, dass die Regulation im Fieber auf einen höheren Grad eingestellt ist. Wenn wir an dieser Vorstellung festhalten, so erfolgt die Einstellung des Organismus auf diesen höheren Grad während des Temperaturanstiegs. Die grösseren Schwankungen der Wärmeabgabe, welche während dieser Zeit von Senator und mir beobachtet wurden, wären alsdann dahin zu deuten, dass der Organismus den Wirkungen des Fieber erregenden Agens bald mehr nachgibt, bald mehr entgegenarbeitet, bis er sich der Wirkung schliesslich vollständig unterwirft.

Mit diesem Zeitpunkt, dem Eintritt der constanteren Temperatur und der gleichmässigeren Wärmeabgabe, werden die Schwankungen geringer.

Als Beweis für die Anschauung, dass auch im Fieber eine Regulation der Wärmeproduction nach dem Wärmeverlust besteht, wenn auch nicht ganz so vollständig und prompt als in der Norm, diene für Liebermeister besonders die Beobachtung, dass sich der fiebernde Mensch im kalten Bade leichter abkühlt, als der nichtfiebernde, und dass die hohe Temperatur sich im Verlauf einiger Zeit alsbald wieder herstellt.

Meine Versuche am Kaninchen zeigen, dass mit steigender Wärmeproduction auch die Wärmeabgabe steigt. Eine Steigerung der Körpertemperatur über eine gewisse Höhe findet nie statt, obgleich die Wärmeproduction, wie die Wärmeabgabe zeigt, höhere Körpertemperatur herbeizuführen ausreichend gewesen wäre. Ein Todesfall, der auf eine Steigerung der Temperatur zu beziehen wäre, wurde nicht beobachtet. Aber auch sonst finden wir in meinen Versuchen Zeichen einer noch bestehenden Regulation während des Fiebers.

Die Wasserverdunstung nimmt bald zu, bald ab, indem sie die Wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung bald mehr, bald weniger vertritt. Auch der umgebenden Temperatur ist ein gewisser Einfluss auf Wärmeabgabe wohl nicht abzusprechen, wenn wir auch zur Zeit bei so geringen Temperaturschwankungen, wie sie in meinen Versuchen vorkommen, die Wirkungen im Einzelnen noch nicht überblicken. Ob auch die grössere Ventilation im Fieber eine Gegenregulation hervorruft, ist durch meine Versuche zwar nicht mit Bestimmtheit entschieden worden, jedoch scheinen die Resultate für eine solche Annahme zu sprechen. Es muss die Klarstellung dieser beiden Punkte weiteren Versuchen überlassen bleiben, ebenso die Beantwortung der Frage, inwieweit beim experimentell erzeugten Fieber der Kaninchen die Wärmeregulation, die wir als bestehend annehmen zu dürfen glauben, eine Beeinträchtigung erfahren hat.

Ueber die Art der Störung und den Angriffspunkt des Gifts, welches das Fieber hervorruft, hielt Liebermeister mit seinem Urtheil zurück. Dagegen finden wir bei anderen Autoren, so bei Dubczanski und Naunyn¹⁾, Finkler²⁾, Claude Bernard³⁾

1) v. Dubczanski und B. Naunyn, Beiträge zur Lehre von der fieberhaften Temperaturerhöhung. Archiv f. experim. Pathol. u. Pharmak. Bd. 1.

2) a. a. O. 3) a. a. O.

Hypothesen, welche sich auf die Annahme von Wärmecentren stützen, oder auch auf die Annahme von Nervenfasern, welche im Rückenmark verlaufen und welche einen regulirenden Einfluss auf die Wärmeproduction ausüben.

Naunyn und Quincke¹⁾ wiesen nach:

1. „Dass auch bei kleineren Thieren (kleineren oder mittelgrossen Hunden) Rückenmarksquetschung im unteren Halstheil constant nicht Sinken, sondern sogar sehr bedeutende Steigerung der Körpertemperatur bewirkt, wenn die Wärmeabgabe durch Einführung der Thiere in einen warmen Raum gehemmt wird, in welchem, wie Controllversuche zeigten, Thiere mit normalem Rückenmark sich viele Stunden aufhalten konnten, ohne eine Steigerung ihrer Körpertemperatur zu erfahren.“

2. „Dass sich das Gleiche, das Steigen der Körpertemperatur der Thiere, nach einer Operation ebenso constant auch ohne Anwendung einer künstlichen Erwärmung bei einer mittleren Temperatur der Atmosphäre dann einstellt, wenn die Thiere so ausgewählt werden, dass bei ihnen an und für sich die (unter a) angeführten, für das Ueberwiegen der Wärmeproduction günstigen Bedingungen erfüllt sind, d. h. wenn man den Versuch möglichst an grossen Thieren (recht grossen Hunden) anstellt.“

„Hieraus schlossen Naunyn und Quincke, dass im Rückenmark neben den Fasern, welche einen regulirenden Einfluss auf die Wärmeabgabe bewirken, auch solche Nervenfasern verlaufen, die einen regulirenden (hemmenden) Einfluss auf die Wärmebildung vermitteln; lediglich so sei die trotz der gesteigerten Wärmeabgabe unter den angeführten Bedingungen nach der Rückenmarkdurchschneidung constant auftretende Steigerung der Körpertemperatur zu erklären.“

Doubczanski und Naunyn glauben dann die Resultate der Fieberversuche wie auch diejenigen nach Rückenmarkdurchschneidung zurückführen zu können auf einen lähmungsartigen Zustand gewisser Theile des Centralnervensystems, wodurch gleichzeitig eine Steigerung der Wärmeabgabe gerade so gut, wie eine Steigerung der Wärmebildung bedingt wird.

1) Naunyn u. Quincke, Ueber den Einfluss des Centralnervensystems auf die Wärmebildung. Reichert's u. Du Bois-Reymond's Archiv 1869.

Durch die Versuche von Naunyn und Quincke schien mir der Beweis, dass nach Durchtrennung des Rückenmarks neben der Wärmeabgabe auch die Wärmeproduction gesteigert sei, nicht vollständig erbracht, da eine genaue Messung der Wärmeabgabe nicht stattfand.

Ich habe daher bei Kaninchen, welchen ich das Rückenmark in der Höhe des sechsten und siebenten processus spinosus durchschnitten habe, mit dem Rubner'schen Calorimeter die Wärmeabgabe direct gemessen. Die Resultate habe ich in Tabelle XXIV zusammengestellt.

(Siehe diese Tabelle auf S. 69.)

Durch die directe Messung wurde gefunden, dass bei einem Kaninchen (Vers. I), dem das Rückenmark in der Höhe des sechsten bis siebenten processus spinosus cervic. durchschnitten ist, die Wärmeabgabe und Wärmeproduction nicht nur nicht vermehrt zu sein braucht, sondern fast dauernd von Stunde zu Stunde abnimmt und bei Eintreten des Todes bis auf ein Minimum gesunken ist.

In Versuch II wurde dem Kaninchen drei Stunden nach der Durchschneidung des Rückenmarks Rothlauf-Bouillon-Cultur in die Ohrvene injicirt. Eine Aenderung im Verlaufe des Temperaturabfalls war nicht bemerkbar, vorübergehend wurde aber in den Stunden von 4 bis 1 Uhr (7. XI) ein geringes Wiederansteigen der Wärmeabgabe durch Leitung und Strahlung beobachtet. Ob diese vorübergehende, geringe Steigerung von der Injection des Giftes abhängig zu machen ist, müssten weitere Versuche zeigen.

Durch meine Versuche wird somit die Vermuthung Liebermeisters¹⁾, dass die Wärmeregulation nach Durchtrennung des Rückenmarks aufgehört zu haben scheint, bis zu einem gewissen Grade bestätigt.

Ich schliesse aus meinen Versuchen, dass nach Durchtrennung des Rückenmarks in der Höhe des sechsten und siebenten processus spinosus cervic. die Wärmeregulation beim Kaninchen eine Beeinträch-

1) Liebermeister, a. a. O. (S. 59) S. 127.

Tabelle) XXIV. Versuch I.

Datum	Stunde	Gewicht des Kaninchens	Temperatur d. Kaninch.	Temperatur des /immers	Ausschläge des Spiromet.	Wärmeabgabe durch Strahlung und Leitung	Wärmeabgab. d. Wasserd. durch Wasserdunstung	Gesamt-wärmeabgabe in Calorien	Bemerkungen		
1. XI.	Morgens 7 ³⁵ —8 ³⁵	1625	35,3	16,9	240	2,774	0,6931	1,229	4,696	7 h 20 bis 7 h 35 Operat.: Rückenmark zwischen VI. bis VII. proc. spin. cervic. durchschnitten Unmittelbar nach der Operation wird Kaninchen in das Calorimeter gebracht.	
	8 ³⁵ —9 ³⁵			16,8	253	2,954	0,6264	0,715	4,295		
	9 ³⁵ —10 ³⁵			16,8	238	2,746	0,623	0,3702	3,739		
	10 ³⁵ —11 ³⁵			16,8	225	2,570	0,6188	0,2124	3,396		
	11 ³⁵ —12 ³⁵			16,8	210	2,370	0,5191	0,1254	3,014		
	12 ³⁵ —1 ³⁵			16,9	203	2,279	0,5163	0,0642	2,859		
	1 ³⁵ —2 ³⁵			27,5	16,7	198	0,4791	0,1140			
	2 ³⁵ —3 ³⁵				16,9	181	0,3996	0,0924			
	3 ³⁵ —4 ³⁵				16,8	176	0,3532	0,0870			
	4 ³⁵ —5 ³⁵				17,3	148	0,3164	0,042			
	5 ³⁵ —6 ³⁵				17,9	129	0,3251	nicht nachweisbar			
	6 ³⁵ —7 ³⁵			23,7	18,1	128	0,3438	0,0498			
	7 ³⁵ —8 ³⁵				18,1	125	0,3395	0,0252			
8 ³⁵ —9 ³⁵	18,6	121	0,3224		0,0288						
9 ³⁵ —10 ³⁵	24,3	18,7	116	0,326	0,0588						
10 ³⁵ —11 ³⁵		18,6	128	0,328	nicht nachweisbar						
11 ³⁵ —12 ³⁵		18,6	110	0,322	"						
2. XI.	Morgens 8—9		22,0	16,9	66		0,1675	0,0216	Kaninchen stirbt 9 h 30 Abds. Section ergibt vollständige Durchtrennung des Rückenmarks.		
	9—10			16,9	75		0,1656	0,0198			
	10—11			16,9	67		0,1656	0,0216			
	11—12			17,1	60		0,1427	0,0192			
	12—1			17,4	50		0,1173	0,0174			
	1—2			17,2	53		0,1331	nicht nachweisbar			
	2—3			20,7	17,2	50	0,1231	"			
	6—7				17,1	38	0,1297	"			
Versuch II.											
6. XI.	Nachm. 2 ⁴⁵ —3 ⁴⁵	1411	35,3	15,3	268	3,165	0,6498	0,349	4,163	2 h 20 bis 2 h 45 Operation: Durchschneidung des Rückenmarks in der Höhe des VI. bis VII. proc. spin. cervic. Unmittelbar nach der Operation wird Kaninchen in das Calorimeter gebracht.	
	3 ⁴⁵ —4 ⁴⁵			15,2	270	3,194	0,6148	0,275	4,085		
	4 ⁴⁵ —5 ⁴⁵			29,3	16,0	205	2,306	0,4868	0,129		2,921
	5 ⁴⁵ —6 ⁴⁵										
	6 ⁴⁵ —7 ⁴⁵			16,6	150		0,3556	0,399			
	7 ⁴⁵ —8 ⁴⁵			16,9	131		0,3210	0,191			
	8 ⁴⁵ —9 ⁴⁵			17,4	103		0,3719	0,0211			
	9 ⁴⁵ —10 ⁴⁵			17,9	83		0,3981	0,255			
	10 ⁴⁵ —11 ⁴⁵			18,4	68		0,355	nicht nachweisbar			
	11 ⁴⁵ —12 ⁴⁵			18,7	57		0,3546	"			
7. XI.	12—1		26,2	19,0	45		0,3542	"	Ventilation pro Stunde im Mittel 815 l.		
	1—2			19,3	34		0,3323	"			
	2—3			19,5	29		0,3281	"			
	3—4			19,8	27		0,3318	0,0294			
	4—5			19,8	30		0,3338	nicht nachweisbar			
	5—6			19,5	52		0,3301	"			
	6—7			19,2	54		0,2814	"			
	7—8			18,5	85		0,3171	"			
	8—9			18,3	72		0,3194	"			
	12—1			23,3	17,2	66	0,2596	"			
	4—5				16,9	19	0,1367	"			
	5—6			22,9	17,4	—	0,1399	0,0193	Kaninchen stirbt 11 h Abs. Section ergibt vollständige Durchtrennung des Rückenmarks.		
	6—7				17,4		0,1651	nicht nachweisbar			
	9—10			22,6							

1) Die Aichungswerthe der Spirometausschläge unterhalb 200⁰ standen mir nicht zur Verfügung. Die Berechnung der absoluten Calorienwerthe war daher in diesen beiden Versuchen nur in beschränktem Maasse möglich.

tigung erfahren hat, und zwar sind die Thiere nicht in der Lage, einer Abkühlung des Körpers oder einer Ueberhitzung desselben in dem gleichen Grade wie bei intactem Rückenmark vorzubeugen, sei es nun, dass die Ueberhitzung spontan erfolgt wie bei grossen Thieren oder durch eine künstliche Beschränkung der Wärmeabgabe.

Ich würde mich zuweit auf den Boden der Hypothese begeben, wenn ich weitere Schlüsse aus meinen Versuchen ziehen wollte. Die Folgerungen, welche man bisher aus den Erscheinungen nach Durchschneidung und Quetschung des Rückenmarks zu ziehen geneigt war, scheinen mir indessen eine bemerkenswerthe Einschränkung erfahren zu müssen.

Aronsohn und Sachs¹⁾ sind geneigt, den Zustand, in welchen Kaninchen nach einem gelungenen Einstich in das corpus striatum gerathen, als einen fieberhaften zu bezeichnen. Dieser Zustand geht einher mit anhaltender Temperatursteigerung und vermehrter Respiration und Pulsfrequenz. Sie zeigten ferner, „dass bei der durch Einstich erzeugten Temperatursteigerung, ebenso wie beim gewöhnlichen Fieber, jedesmal eine erheblichere Steigerung des Eiweisszerfalls stattfindet.“

Die Entdeckung von Aronsohn und Sachs schien geeignet, in der That Anhaltspunkte für die Localisation gewisser Wärmecentren bringen zu sollen. Alsbald zeigte jedoch Mosso²⁾ durch zahlreiche Versuche, die er über die Localisation von Wärmecentren im Gehirn des Hundes mit negativem Erfolg anstellte, dass eine Verallgemeinerung des Befundes von Aronsohn und Sachs nicht statthaft sei. Er hofft, den Beweis geliefert zu haben, „dass für die Annahme von Centren im Gehirn, von denen die Erhöhung der Körpertemperatur abhängt, die thatsächliche Grundlage fehlt“³⁾.

Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass trotzdem die Symptome, welche nach dem Wärmestich bei Kaninchen auftreten, einen Ver-

1) Aronsohn u. Sachs, Die Beziehungen des Gehirns zur Körperwärme und zum Fieber, S. 232. Pflüger's Archiv Bd. 37.

2) Mosso, Die Lehre vom Fieber in Bezug auf die centralen Wärmecentren. Archiv f. experim. Pathol. und Pharmak. Bd. 26 S. 316.

3) Vergl. bei Mosso die Litteraturangaben über die Lehre von den Wärmecentren. Archiv f. experim. Pathol. u. Pharmak. Bd. 26 S. 321.

gleich des erzielten Zustands mit dem Fieber geradezu herausfordern.

Gottlieb¹⁾ und Richter²⁾ führten calorimetrische Messungen am Kaninchen aus, bei denen durch Verletzung des corpus striatum Steigerung der Körpertemperatur erzielt worden war. Während des Anstiegs der Temperatur wurde eine Verminderung der Wärmeabgabe beobachtet, später stieg die Wärmeproduction.

Aus dieser Beobachtung hat man ferner die Berechtigung entnehmen zu können geglaubt, die Temperatursteigerung nach Wärmestich dem fieberhaften Zustand zu vergleichen.

May³⁾ ist der Ansicht, dass die Steigerung der Oxydation im Fieber auf eine primäre Reizung der Temperaturcentren durch die Toxine zurückzuführen sei, indem er auf die Versuche von Aronsohn und Sachs und ausserdem auf die Versuche von Gottlieb verweist.

Anderseits schloss man, indem man den Zustand nach Wärmestich als Fieber betrachtete (von Noorden⁴⁾), dass Fieber mit WärmeRetention beginnt.

Die Versuche von Aronsohn und Sachs auf der einen Seite und die von Gottlieb auf der anderen Seite dürfen aber bisher, wie ich glaube, noch nicht endgültig in einen solchen Zusammenhang zum Fieber gebracht werden.

Gottlieb⁵⁾, ebenso auch Richter lässt es bei seinen calorimetrischen Versuchen an der nothwendigen Berücksichtigung der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung fehlen. Dieser Weg der Wärmeabgabe scheint mir aber bei diesen Versuchen um so beachtenswerther, als die Thiere durch die Operation einem sehr schweren Eingriff ausgesetzt waren, nach welchem notorisch die Respiration beschleunigt sein soll (Aronsohn und Sachs).

1) Gottlieb, Calorimetrische Untersuchungen über die Wirkungsweise des Chinins und Antipyrins. Arch. f. experim. Pathol. u. Pharm. Bd. 28 S. 167.

2) Richter, Experimentaluntersuchungen über Antipyrese und Pyrese, nervöse und künstliche Hyperthermie. Virchow's Archiv Bd. 123 S. 118.

3) May, a. a. O. S. 68 u. 70.

4) v. Noorden, Lehrbuch der Pathologie des Stoffwechsels, S. 189.

5) Gottlieb stellte seine Versuche im hygienischen Institut zu Marburg an. Die Versuche über die Bedeutung der Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung waren damals noch nicht soweit gefördert, dass Gottlieb dieselben gebührend berücksichtigen konnte.

Richter fand im Thermostaten, „dass gegen Abkühlung sich das trepanirte Thier nicht zu wehren beginnt, wenn seine Temperatur bis unter die Norm erniedrigt ist, und dass die trepanirten Thiere der Erhöhung ihrer Temperatur gar keinen Widerstand entgegensetzen“, während das fiebernde Thier sowohl der Erhöhung als auch der Abkühlung seiner Temperatur früher durch Gegenregulation einen Widerstand entgegensetzte. Richter glaubt somit einen fundamentalen Unterschied zwischen einem fiebernden Thier und einem Kaninchen, bei welchem der Wärmestich ausgeführt ist, festgestellt zu haben.

Es scheint mir nach alledem auch heute noch verfrüht, über das Wesen des Fiebers Hypothesen aufzustellen, die sich auf Annahme bestimmter Wärme-centren stützen.

Wir müssen uns vielmehr unter Berücksichtigung der neueren Arbeiten auf dem Gebiete der thierischen Wärme und auf Grund unserer eigenen Versuche damit begnügen, von neuem zu betonen, dass die Steigerung der Körpertemperatur im Fieber zu Stande kommt durch eine Störung der Wärme-regulation.

Des weiteren veranlassen mich die Resultate meiner Versuche zur Aufstellung folgender Schlussätze:

1. Während des Fiebers kann eine Steigerung der Wärme-production und der Wärmeabgabe stattfinden.

2. Die Möglichkeit, dass Steigerung der Körpertemperatur im Fieber ohne Vermehrung der Wärmeproduction zu Stande kommen kann, ist nicht ausgeschlossen, wenngleich der einwandsfreie Beweis, dass Fieber allein durch Wärmeretention entstehen kann, noch nicht erbracht ist.

3. Während des Fieberanstiegs kann man grössere Schwankungen der stündlichen Wärmeabgabe beobachten, als im fieberfreien Zustande.

4. Bei einer Steigerung der Gesamtwärmeabgabe im Fieber (beim Kaninchen) bleibt das Verhältniss zwischen Wärmeabgabe durch Wasserverdunstung und Wärmeabgabe durch Leitung und Strahlung annähernd das gleiche wie im fieberfreien Zustande.

5. Die Beeinflussung der Wärmeabgabe durch äussere Eingriffe wird im Fieber in ähnlicher Weise beobachtet, wie im fieberfreien Zustande.

6. Eine gewisse Regulation der Wärmeabgabe im Fieber scheint zu bestehen.

7. Nach Durchschneidung des Rückenmarks in der Höhe des sechsten bis siebenten processus spinosus cervic. (beim Kaninchen) kann man eine dauernde Abnahme der Wärmeabgabe und Wärme-production beobachten.

8. Nach Durchschneidung des Rückenmarks in der angegebenen Höhe hat die Wärmeregulation insoweit eine Beeinträchtigung erfahren, als die Thiere weder in der Lage sind, einer Abkühlung des Körpers noch einer Ueberhitzung desselben durch künstliche Beschränkung der Wärmeabgabe in dem Grade vorzubeugen, wie sie es bei intactem Rückenmark zu thun im Stande sein würden.



16734

